


MITH SAMLANH





SURVEY OF SUBSTANCE USE AMONG YOUNG PEOPLE ON THE STREETS OF PHNOM PENH

CARRIED OUT BY STAFF OF MITH SAMLANH DRUG PROGRAM

June 2005

Supported by:



MITH SAMLANH




SURVEY OF SUBSTANCE USE AMONG YOUNG PEOPLE ON THE STREETS OF PHNOM PENH

CARRIED OUT BY STAFF OF MITH SAMLANH DRUG PROGRAM

June 2005

Supported by:



german
agro
action



Important Remarks

This report covers substance use among street children and vulnerable youth in Phnom Penh only. Obviously it is only an aspect of the situation within Cambodia, since we did not address the situation among other youth groups, that are also significant substance users (gangs-Bong Thom, children attending school, college students, etc.), nor did we the address the situation among adult populations.

It would therefore be dangerous this survey was used to scapegoat the street children and vulnerable youth for drug use in the Cambodian context, as has been the general trend.

METHODOLOGY

This survey was carried out in June 2005, with three groups of children:

- Children living alone and unsupported on the streets of Phnom Penh,
- Children of street living families,
- Children living in the community and working on the streets.

The questionnaire was designed to provide total anonymity to the participating children (no names or exact locations were recorded). The information gathered included: age and gender, the number of substances used and the type of substances used, methods of intake, plus a question about selling blood.

All comments and conclusions are based upon comparisons with previous surveys: October 1999, June 2000, June 2001, October 2002, and April 2004, in order to monitor trends and the evolution of substance use culture. There are no comparisons with any information collected in the year 2003 as the target population was strongly affected by the National Elections that occurred in July and resulting anxieties regarding personal security. In order to ensure comparison with previous surveys, the same categories of substances are defined: Glue, ATS (yama/yaba) ingested or smoked, Injection (including heroin, and ATS), Medicines (Valium, Reduxen, etc.), Alcohol and 'Other' (cannabis, cocktails- medicine mixed with alcohol-, gasoline, etc.). This Survey excluded cigarettes.

- Street living children/youth are separated into two categories to reflect differing lifestyles. These are children living unsupported on the streets, and children of street living families.
- The section covering types of substances includes specific types of substances injected intravenously (previous surveys prior to 2004 only described 'injecting drug use').
- The 'Types of substances used' section includes known methods of intake of each substance used, for example: injection, smoking/'chasing', inhaling etc.

There have been no changes to the survey methodology over 2004.

The survey was carried out by staff of the Mith Samlanh Drug, and Outreach Teams on the streets, with staff of Life Skill and Reintegration teams working with young people in the community.

The survey was carried out in one day to avoid duplication, since the target population can be extremely mobile

THE TARGET GROUP

TOTAL STREET CHILDREN/YOUTH

Aged	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
BOYS	84 (64.12%)	212 (64.63%)	509 (68.41%)	350 (78.47%)	525 (84.4%)	1680 (73.97%)
GIRLS	47 (35.88%)	116 (35.37%)	235 (31.59%)	96 (21.53%)	97 (15.6%)	591 (26.03%)
TOTAL	131 (5.76%)	328 (14.44%)	744 (32.76%)	446 (19.63%)	622 (27.41%)	2271

Total Street Living Alone Children/Youth

Aged	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
BOYS	8 (66.66%)	26 (72.28%)	92 (80.7%)	134 (88.74%)	268 (86.17%)	528 (84.75%)
GIRLS	4 (33.34%)	9 (27.72%)	22 (19.3%)	17 (11.26%)	43 (13.83%)	95 (15.25%)
TOTAL	12 (1.92%)	35 (5.61%)	114 (18.29%)	151 (24.23%)	311 (50.05%)	623 (27.43%)

Total Street living Family Children/Youth

Aged	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
BOYS	32 (60.37%)	46 (56.09%)	75 (59.52%)	38 (77.55%)	25 (73.52%)	216 (62.79%)
GIRLS	21 (39.63%)	36 (43.91%)	51 (40.48%)	11 (22.45%)	9 (26.48%)	128 (37.21%)
TOTAL	53 (15.4%)	82 (23.83%)	126 (36.62%)	49 (14.24%)	34 (9.91%)	344 (15.14%)

Total Street Working Children/Youth

Aged	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
BOYS	44 (66.66%)	140 (66.35%)	342 (67.85%)	178 (72.35%)	232 (83.75%)	936 (71.77%)
GIRLS	22 (33.34%)	71 (33.65%)	162 (32.15%)	68 (27.65%)	45 (16.25%)	368 (28.23%)
TOTAL	66 5.06%)	211 (16.18%)	504 (38.65%)	246 (18.86%)	277 (21.25%)	1304 (57.43%)

COMMENTS

The number of children and youth contacted in this survey exceeded the number interviewed in any previous substance use survey since surveys began in 1999. The highest previous number of contacts was 1,843 in 2002. This reflects the increasing capacity of Mith Samlanh to reach children on the streets.

The increase in the population interviewed appears to be consistent across the age range, with the exception of the oldest (19-23) age range, which has almost doubled over 2004. There was significant anxiety within this age group in 2004 due to pick ups by the authorities, and though there had been concerns among the street youth in the first two months of 2005, by the time of the survey there had been little activity and therefore youth were much easier to identify. There was an increase in both the numbers of boys and girls identified, though the rate of increase within girls (41.3% over 2004) was higher than in boys (30.7%).

The numbers of children and youth contacted within the lone street living, children of street families, and street working children, all increased over previous years, though the largest increase (almost doubled) was within the lone street living population.

Total Street Children/Youth

Use and Multiple Uses of Substances

	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
Using Substances (Total)	Boys	17 (94.44%)	57 (93.44%)	154 (92.77%)	237 (86.18%)	473 (88.74%)	938 (89.07%)
	Girls	1 (5.56%)	4 (6.56%)	12 (7.23%)	38 (13.82%)	60 (11.26%)	115 (10.93%)
	Total	18 (1.7%)	61 (5.79%)	166 (15.76%)	275 (26.11%)	533 (50.64%)	1053 (46.36%)
Using 1 Substance	Boys	16 (94.11%)	55 (93.22%)	114 (91.2%)	132 (82.5%)	232 (87.54%)	549 (87.69%)
	Girls	1 (5.89%)	4 (6.78%)	11 (8.8%)	28 (17.5%)	33 (12.46%)	77 (12.31%)
	Total	17 (2.71%)	59 (9.42%)	125 (19.86%)	160 (25.55%)	265 (42.36%)	626 (59.44%)
Using 2 Substances	Boys	1 (100%)	2 (100%)	37 (97.36%)	77 (91.66%)	140 (90.9%)	257 (92.11%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.64%)	7 (8.34%)	14 (9.1%)	22 (7.89%)
	Total	1 (0.35%)	2 (0.71%)	38 (13.62%)	84 (30.1%)	154 (55.22%)	279 (26.49%)
Using 3 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	22 (95.65%)	79 (86.81%)	103 (88.79%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4.35%)	12 (13.19%)	13 (11.21%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	2 (1.72%)	23 (19.82%)	91 (78.46%)	116 (11.01%)
Using 4 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	6 (85.71%)	17 (94.44%)	24 (92.3%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (14.29%)	1 (5.56%)	2 (7.7%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.84%)	7 (26.92%)	18 (69.24%)	26 (2.46%)
Using 5 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	5 (83.33%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (16.67%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (16.67%)	5 (83.33%)	6 (0.56%)

COMMENTS

The total number of street youth using substances identified was 1,053, which represents 46.36% of the total (or almost half of the) population. Previously only the total street living populations was collected together and in 2004 showed a 50.7% prevalence of substance use (see following section).

Within the target population almost 90% of substance use was within the male population, which is disproportionate to the male female ratio on the streets (74% male against 26% female) and shows that substance use is growing more quickly in the male population than in the female.

The majority of substance using street youth are using one substance (59.44%), but multiple use of substances appears to be very common within street children and youth, and reflects the chaotic nature of street life and the rapidly changing and fluid nature of a developing substance use culture, and the concentration of multiple substance use within the oldest age group suggests that it has links to other mechanisms such as the ability to income generate, mobilize, and to access situations as young adults where different substances are more available.

TOTAL STREET CHILDREN/YOUTH

Types of substances used, and method of intake

Substances Type/use	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
GLUE	Boys	10 (90.9%)	46 (93.87%)	109 (95.61%)	97 (95.09%)	72 (91.13%)	334 (94.88%)
	Girls	1 (9.1%)	3 (6.13%)	5 (4.39%)	5 (4.91%)	4 (8.87%)	18 (5.12%)
	Total	11 (3.12%)	49 (13.02%)	114 (32.38%)	102 (28.97%)	79 (21.61%)	352 (33.42%)
ATS Swallowed (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Injected (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (0.16%)
ATS Smoked (Yama)	Boys	2 (100%)	3 (100%)	62 (93.93%)	169 (90.86%)	346 (88.49%)	582 (89.95%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	4 (6.07%)	17 (9.14%)	44 (11.29%)	65 (10.05%)
	Total	2 (0.3%)	3 (0.46%)	66 (10.18%)	186 (28.7%)	390 (60.3%)	647 (99.84)
ATS Total Use (Yama)	Boys	2 (100%)	3 (100%)	62 (93.93%)	169 (90.86%)	346 (88.71%)	582 (98.95%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	4 (6.03%)	17 (9.14%)	45 (11.51%)	66 (10.19%)
	Total	2 (0.3%)	3 (0.46%)	66 (10.18%)	186 (28.74%)	391 (60.36%)	648 (61.5%)
Heroin Injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)	17 (94.44%)	118 (95.16%)	138 (95.17%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (5.56%)	6 (4.84%)	7 (4.83%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	3 (2.06%)	18 (12.41%)	124 (85.53%)	145 (66.2%)
Heroin Smoked	Boys	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	19 (76%)	42 (93.33%)	65 (87.83%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (24%)	3 (6.67%)	9 (12.17%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	4 (5.4%)	25 (33.78%)	45 (60.82%)	74 (33.78%)
Heroin both smoked and injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	3 (100%)	31 (100%)	35 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.86%)	3 (8.57%)	31 (88.57%)	35 (16%)
Heroin Total Use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)	36 (83.72%)	160 (94.67%)	203 (92.69%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (16.28%)	9 (5.33%)	16 (7.31%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	7 (3.19%)	43 (19.63%)	169 (77.18%)	219 (20.79%)
Ketamine Sniffed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	9 (90%)	10 (90.9%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (10%)	1 (9.1%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9.1%)	10 (90.9%)	11 (84.61%)
Ketamine Swallowed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	2 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)	2 (15.39%)
Ketamine Total use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	10 (90.9%)	12 (92.3%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9.1%)	1 (7.7%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (15.39%)	11 (84.61%)	13 (12.3%)
Cannabis Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (92.85%)	40 (93.02%)	53 (92.98%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (7.15%)	3 (6.98%)	4 (7.02%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (24.56%)	43 (75.44%)	57 (5.41%)
Alcohol Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	19 (90.47%)	97 (94.17%)	120 (93.75%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (9.53%)	6 (5.83%)	8 (6.25%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	4 (3.12%)	21 (16.4%)	103 (80.48%)	128 (12.15%)
Sedative total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	4 (44.44%)	15 (71.42%)	20 (64.51%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (55.56%)	6 (28.58%)	11 (35.49%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.22%)	9 (29.04%)	21 (67.74%)	31 (2.94%)
Mixed drug Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	4 (66.66%)	34 (94.44%)	40 (90.9%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (33.34%)	2 (5.56%)	4 (9.1%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	2 (4.54%)	6 (13.63%)	36 (81.83%)	44 (4.17%)
Other	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	4 (75%)	8 (88.88%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (25%)	1 (11.12%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (44.44%)	5 (55.56%)	9 (0.86%)
Blood Selling	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (88.88%)	63 (96.92%)	71 (95.94%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (11.12%)	2 (3.08%)	3 (4.06%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (12.16%)	65 (87.84%)	74 (7.02%)

COMMENTS

Within the total target population Amphetamine Type Substances (Yama) remains the most common substance used by street youth (61.5%), followed by Glue (33.42%), and Heroin (20.79%).

Smoking of substances is shown to be the most common method of intake (73.8%), followed by raw inhalation (34.4%), oral intake (15.2%, principally alcohol), and injection at 13.9%.

The level of injection drug use is concerning as it shows a 4.1% increase over 2004 (9.8%).

Glue

Glue use has reduced relative to 2004 from 51.4% of the substance using population to 34.2% in 2005, which indicates that it is being superseded by amphetamines and also heroin as the principle drug among street youth. Glue use has reduced significantly in the older age range, while it is increasing among the younger population, suggesting that it is becoming the principle "gateway" drug for younger children, while glue use among females across all age ranges continues the trend of reduction that began in 2002 (glue use has always been significantly more common in the male population).

Amphetamines (Yama)

Use of Amphetamines has shown a steady increase since its first appearance on the streets in 2000, and the trend is continuing with a 7% increase in Amphetamine use among the street youth over 2004.

The use of amphetamines has increased across the entire age range, including introduction to the youngest age range (0-8 years) for the first time. The greatest increase is in the older age range, where amphetamines continue to replace glue as the most common substance used.

Amphetamine use has increased in the male and female populations, but as with other substances the rate of increase is significantly higher in males.

Heroin

Use of Heroin among street youth has increased significantly over 2004, when prevalence reached 7.2%, to 20.79% in 2005. This represents the largest increase in Heroin use since it established in 2000, and suggests its greater availability and popularity on the streets;

Heroin use has increased among all age ranges, but once again is becoming increasingly prevalent in the oldest age range, conversely heroin has become less prevalent among females than in 2004, which suggests that Amphetamines are the preferred substance among females.

There might be a number of factors for this, cultural, situational, and perceptual.

Prior to 2005, the principle method of intake of Heroin was by smoking/chasing. In 2004 42.8% of Heroin users were injecting. In 2005 the level of injecting among Heroin users has increased to 66.2%, and is now the principle intake method.

Injection use has increased among males and females? But in line with the increase of Heroin use generally, the greatest increase injecting is within the oldest age range in the male population.

Ketamine

Ketamine use remains on the fringe of the substance use culture, but continues to increase in its use over previous years.

Cannabis

Cannabis use has reduced in 2005 over 2004 (by 8.3%). Cannabis use alone has never been strongly used by the street child population alone (poor image, cost against effects), but has often been used in combination with Heroin when smoked. The decrease in Cannabis use can be directly related to the increase in injection use of Heroin (cannabis is not used in this practice).

Alcohol

Alcohol use has reduced significantly (26.35%) over 2004. Alcohol use has often been common among the street working child population, who have regular contact with family, and suggested a common link between alcohol use in children and care givers. The increasing use of Amphetamines and Heroin appears to have had an impact on Alcohol consumption, and the reduction in Alcohol use among street working children suggests that caregivers also are moving away from Alcohol use and toward other substances.

Pharmacy drugs

Use of pharmacy drugs (most often sedatives such as benzodiazepines) have decreased significantly over 2004 (from 5% to 2.94%), but have re-established themselves strongly in the female population that showed no pharmacy drug use in 2004 (35.4% in 2005). The reduction in pharmacy drug use suggests a polarization around illicit substances that are cheap and available on the street, as opposed to Pharmacy drugs that are often more expensive and difficult to source. The increase in Pharmacy drug use among females continues to suggest that the substance use culture among males and females is fundamentally different, and might be attributed to reasons for use, and a reflection (even in drug use culture) of the perceptions of what it is felt appropriate or females to do and to behave within the cultural context.

Combined substance use

Mixing of substances when used has increased significantly over 2004 (by over 40%), though established drug combining (such as Heroin with Cannabis) appears to be less prevalent. This suggests that there is an increase in the mixing of stimulant and sedative drugs that are common among the substance using population, such as Amphetamine and Heroin, a remarkably dangerous practice

Other drugs

Other drugs are those drugs that cannot be identified by the interviewers from the descriptions or names given by interviewed children; the level of unidentified drugs shown in 2005 is consistent with those in previous surveys.

Blood selling

The number of children and youth selling blood in 2005 (74) has decreased over 2004 (90), but contacts among street children selling blood suggests that they are doing so more frequently, the same contacts strongly suggest those children and youth that are selling blood are very frequently substance using, and a proportion are injecting substance users, which poses a significant health risk for the general population as substance users (and in particular injecting users) are very highly vulnerable to blood borne infections such as HIV.

CHILDREN LIVING ON THE STREETS

Children/Youth living alone on the streets

	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
Using Substances (Total)	Boys	1 (50%)	7 (87.5%)	58 (93.54%)	106 (85.48%)	254 (86.39%)	426 (86.93%)
	Girls	1 (50%)	1 (12.5%)	4 (6.46%)	18 (14.52%)	40 (13.61%)	64 (13.07%)
	Total	2 (0.4%)	8 (1.63%)	62 (12.65%)	124 (25.3%)	294 (60.02%)	490 (77.55%)
Using 1 Substance	Boys	1 (50%)	5 (83.33%)	37 (90.24)	51 (82.25%)	107 (86.99%)	201 (85.89%)
	Girls	1 (50%)	1 (16.67%)	4 (9.76%)	11 (17.75%)	16 (13.01%)	33 (14.11%)
	Total	2 (0.85%)	6 (2.56%)	41 (17.52%)	62 (26.49%)	123 (52.58%)	234 (47.75%)
Using 2 Substances	Boys	0 (0%)	2 (100%)	19 (100%)	37 (86.04%)	84 (88.42%)	142 (89.3%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (13.96%)	11 (11.58%)	17 (10.7%)
	Total	0 (0%)	2 (1.25%)	19 (11.94%)	43 (22.75%)	95 (64.06%)	159 (32.44%)
Using 3 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	14 (93.33%)	50 (80.64%)	65 (83.33%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (6.67%)	12 (19.36%)	13 (16.67%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (1.28%)	15 (19.23%)	62 (79.49%)	78 (15.91%)
Using 4 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	4 (100%)	10 (90.9%)	15 (93.75%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9.1%)	1 (6.25%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (6.25%)	4 (25%)	11 (68.75%)	16 (3.26%)
Using 5 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)	3 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)	3 (0.64%)

Children/Youth living with Family on the streets

	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
Using Substances (Total)	Boys	8 (100%)	9 (90%)	24 (88.88%)	28 (100%)	19 (79.16%)	88 (34.3%)
	Girls	0 (0%)	1 (10%)	3 (11.12%)	0 (0%)	5 (29.84%)	9 (9.28%)
	Total	8 (8.24%)	10 (10.3%)	27 (27.83%)	28 (28.86%)	24 (24.77%)	97 (9.21%)
Using 1 Substance	Boys	7 (100%)	9 (90%)	17 (89.47%)	19 (100%)	12 (70.58%)	64 (88.88%)
	Girls	0 (0%)	1 (10%)	2 (10.53%)	0 (0%)	5 (29.42%)	8 (11.12%)
	Total	7 (9.72%)	10 (13.88%)	19 (6.96%)	19 (26.38%)	17 (43.06%)	72 (74.22%)
Using 2 Substances	Boys	1 (100%)	0 (0%)	7 (87.5%)	7 (100%)	5 (100%)	20 (95.23%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (12.5%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (4.77%)
	Total	1 (4.76%)	0 (0%)	8 (38.9%)	7 (33.33%)	5 (23.82%)	21 (21.64%)
Using 3 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	2 (100%)	4 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (50%)	2 (50%)	4 (4.14%)

COMMENTS

The number of lone street youth using substances has increased steadily since 1999, and there has been a further increase in 2005. 77.55% of lone street youth are now using substances over 73.3% in 2004. The lone street child population is the most vulnerable to substance use and reflects the nature of street life with little or now contact with care givers. As in the total population of street youth there has been a substantial increase in substance use within the oldest population group, though increases have occurred throughout.

Multiple substance use has increased substantially within this group, which once again reflects their susceptibility to a rapidly developing substance use culture, and the fact that increasing numbers of youth are now coming to the streets because of their use of substances rather than developing substance use habits after coming to the streets.

The rate of male substance use is increasing more rapidly than in the female population.

The level of substance use among the children of street families population (in previous studies the group using substances the least frequently) has increased from 25.3% in 2004 to 34.35 in 2005, but still remains th group least likely to use substances.

Children/Youth living alone on the Street

Types of substances used and method of intake

Substances Type/use	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
GLUE	Boys	1 (50%)	8 (88.88%)	31 (93.33%)	49 (94.23%)	48 (96%)	137 (93.83%)
	Girls	1 (50%)	1 (11.12%)	2 (6.07%)	3 (5.77%)	2 (4%)	9 (6.17%)
	Total	2 (13.6%)	9 (6.16%)	33 (22.6%)	52 (35.61%)	50 (34.27%)	146 (29.7%)
ATS Swallowed (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Injected (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (0.27%)
ATS Smoked (Yama)	Boys	0 (0%)	1 (100%)	29 (96.66%)	88 (89.79%)	204 (88.31%)	322 (89.44%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.34%)	10 (10.21%)	27 (11.69%)	38 (1.56%)
	Total	0 (0%)	1 (0.27%)	30 (8.33%)	98 (27.22%)	231 (64.18%)	360 (99.73%)
ATS Total Use (Yama)	Boys	0 (0%)	1 (100%)	29 (96.66%)	88 (89.79%)	204 (88.31%)	322 (89.19%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.34%)	10 (10.21%)	27 (11.69%)	39 (10.31%)
	Total	0 (0%)	1 (0.27%)	30 (8.31%)	98 (27.14%)	231 (64.28%)	361 (73.6%)
Heroin Injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)	7 (100%)	87 (94.56%)	97 (95.09%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (5.44%)	5 (4.91%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	3 (2.94%)	7 (6.86%)	92 (90.2%)	102 (43.22%)
Heroin Smoked	Boys	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	15 (83.33%)	28 (90.32%)	47 (88.67%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (16.6%)	3 (9.68%)	6 (11.33%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	4 (7.54%)	18 (33.96%)	31 (58.5%)	53 (34.19%)
Heroin both smoked and injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	3 (100%)	31 (100%)	35 0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.85%)	3 (8.57%)	31 (88.58%)	35 (22.59%)
Heroin Total Use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	7 (100%)	22 (88%)	115 (93.49%)	144 (92.90%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (12%)	8 (6.57%)	11 (7.1%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	7 (46.66%)	25 (16.12%)	123 (37.22%)	155 (31.6%)
Ketamine Sniffed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (75%)	3 (75%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (25%)	1 (25%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	4 (80%)
Ketamine Swallowed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (20%)
Ketamine Total use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (80%)	4 (80%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (20%)	1 (20%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	5 (10.02%)
Cannabis Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	24 (92.3%)	29 (93.54%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7.7%)	2 (6.46%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (16.12%)	26 (83.88%)	31 (6.32%)
Alcohol Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	8 (100%)	51 (91.07%)	60 (92.3%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0	5 (8.93%)	5 (7.7%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (1.53%)	8 (12.3%)	56 (86.17%)	65 (13.2%)
Sedative total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)	12 (80%)	16 (84.21%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (20%)	3 (15.79%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (21.05%)	15 (78.95%)	19 (3.87%)
Mixed drug Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	2 (66.66%)	23 (92%)	27 (90%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.34%)	2 (8%)	3 (10%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	2 (6.67%)	3 (10%)	25 (83.33%)	30 (6.12%)
Other	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	2 (66.6%)	3 (75%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.4%)	1 (25%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (25%)	3 (75%)	4 (5.56%)
Blood Selling	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)	48 (97.95%)	54 (98.1%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.05%)	1 (1.9%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (11%)	49 (89%)	55 (11.2%)

Children/Youth living with Family on the Street

Types of substances used and method of intake

Substances Type/use	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
GLUE	Boys	5 (100%)	10 (100%)	20 (100%)	10 (100%)	3 (75%)	48 (97.95%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (25%)	1 (2.05%)
	Total	5 (10.2%)	10 (20.4%)	20 (40.8%)	10 (20.4%)	4 (8.2%)	49 (50.51%)
ATS Swallowed (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Injected (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Smoked (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	12 (92.3%)	17 (100%)	13 (76.47%)	42 (89.36%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (7.7%)	0 (0%)	4 (25.53%)	5 (10.64%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	13 (27.26%)	17 (36.17%)	17 (36.17%)	47 (100%)
ATS Total Use (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	12 (92.3%)	17 (100%)	13 (76.47%)	42 (89.36%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	1 (7.7%)	0 (0%)	4 (25.53%)	5 (10.64%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	13 (27.26%)	17 (36.17%)	17 (36.17%)	47 (48.4%)
Heroin Injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
Heroin Smoked	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Heroin both smoked and injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Heroin Total Use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (1.03%)
Ketamine Sniffed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Ketamine Swallowed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Ketamine Total use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Cannabis Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (1.03%)
Alcohol Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	4 (100%)	6 (100%)	11 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (9.12%)	4 (36.36%)	6 (54.54%)	11 (11.34%)
Sedative total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (1.03%)
Mixed drug Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Other	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Blood Selling	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (50%)	1 (50%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	2 (2.06%)

COMMENTS

Glue

Use of glue has reduced significantly in both the lone street child population and among children of street living families. Glue use has been superseded by Amphetamine use as the most commonly used substance, but remains the most common substance used among children of street families.

The use of glue has reduced in every age group and in both genders throughout both population groups.

Amphetamines

Amphetamine use has become significantly more prevalent in both population groups over 2004, in the lone street child population it has increased by 9.5% to 73.6% of the substance using population. In the children of street families group Amphetamine use has increased by 23.4% to 48.4% of the substance using population. This confirms the prevalence and availability of Amphetamines shown in the street child population overall.

Heroin

Heroin use within the lone street child population has increased significantly (by 19.4%) over 2004, while it has been observed for the first time (1.03%) among children of street families.

Heroin use has increased strongly within the older age groups and chiefly among males. Injecting remains the most common method of intake among lone street youth, while in the children of street families group, injecting (in tandem with the first evidence of Heroin use) is observed for the first time.

Ketamine

Ketamine use has reduced in the lone street living population, and no incidence of Ketamine use was observed in the children of street families group (as in 2004).

Cannabis

Cannabis use has reduced significantly in both groups compared to 2004, and reflected the trend in the overall population.

Alcohol

Use of alcohol has halved within these groups, and reflects the overall trend in the population. This is particularly notable in the children of street families group where alcohol use had been a significant factor in previous years. This might be attributable to a change in the habits of caregivers on the streets, moving away from alcohol to other abusable substances.

Pharmacy drugs

Use of Pharmacy drugs has reduced in both groups, which reflects trends in the total substance using population.

Combined substance use

Combination substance use has almost doubled in the lone street child population, nonetheless it is still a relatively limited practice. The fact that there remains no combination use in the children of street families group suggests that combination use seems to be linked to Heroin use.

Blood selling

Blood selling continues to be most common among lone street youth and reflects the precarious nature of life on the streets and the increased need to income generate. Blood selling vectors strongly with substance use within this group.

CHILDREN WORKING ON THE STREETS

Children Living in the Community/Street Working

	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
Using Substances (Total)	Boys	8 (100%)	41 (95.34%)	72 (93.5%)	103 (83.73%)	199 (92.99%)	424 (90.98%)
	Girls	0 (0%)	2 (4.66%)	5 (6.5%)	20 (16.27%)	15 (7.01%)	42 (9.02%)
	Total	8 (1.75%)	43 (9.22%)	77 (16.52%)	123 (26.39%)	214 (46.16%)	466 (49.78%)
Using 1 Substance	Boys	8 (100%)	41 (95.34%)	60 (92.3%)	62 (78.48%)	113 (90.4%)	284 (88.75%)
	Girls	0 (0%)	2 (4.66%)	5 (7.7%)	17 (21.52%)	12 (9.6%)	36 (11.25%)
	Total	8 (2.5%)	43 (13.43%)	65 (20.31%)	79 (24.68%)	125 (39.08%)	320 (68.66%)
Using 2 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	11 (100%)	33 (97.05%)	51 (94.44%)	95 (95.95%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.95%)	3 (5.56%)	4 (4.05%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	11 (11.11%)	34 (34.34%)	54 (54.55%)	99 (21.24%)
Using 3 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	6 (100%)	27 (100%)	34 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.94%)	6 (17.64%)	27 (79.42%)	34 (7.29%)
Using 4 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (66.66%)	7 (100%)	9 (90%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.34%)	0 (0%)	1 (10%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (30%)	7 (70%)	10 (2.14%)
Using 5 Substances	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	2 (66.66%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (33.34%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.34%)	2 (66.66%)	3 (0.67%)

COMMENTS

Use of substances among the street working population has increased by 16.95% over 2004 and are now used by half of the street working group. This reflects the general trend of increasing substance use among street children and youth.

Multiple substance use has reduced slightly in this group and reflects the polarization of substance use around Amphetamines, and to a lesser extent heroin, interestingly although multiple use has decreased, the number of substances being used by a minority of users has increased.

Children/Youth living in the Community/Street Working

Substances Type/use	Sex	0-8Years	9-11 Years	12-15Years	16-18Years	19-23Years	Total
GLUE	Boys	4 (100%)	28 (93.33%)	58 (95.08%)	38 (95%)	21 (95.45%)	149 (94.9%)
	Girls	0 (0%)	2 (6.67%)	3 (4.92%)	2 (5%)	1 (4.55%)	8 (5.1%)
	Total	4 (2.54%)	30 (19.1%)	61 (38.35%)	40 (25.47%)	22 (14.04%)	157 (33.69%)
ATS Swallowed (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Injected (Yama)	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
ATS Smoked (Yama)	Boys	2 (100%)	2 (100%)	21 (91.3%)	64 (90.14%)	129 (90.84%)	218 (90.83%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	2 (8.7%)	7 (9.86%)	13 (9.16%)	22 (9.17%)
	Total	2 (0.83%)	2 (0.83%)	23 (9.58%)	71 (29.58%)	142 (59.18%)	240 (100%)
ATS Total Use (Yama)	Boys	2 (100%)	2 (100%)	21 (91.3%)	64 (90.14%)	129 (90.84%)	218 (90.83%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	2 (8.7%)	7 (9.86%)	13 (9.16%)	22 (9.17%)
	Total	2 (0.83%)	2 (0.83%)	23 (9.58%)	71 (29.58%)	142 (59.18%)	240 (51.5%)
Heroin Injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (100%)	30 (96.77%)	41 (97.61%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.23%)	1 (2.39%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (26.19%)	31 (73.21%)	42 (67.74%)
Heroin Smoked	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (57.14%)	14 (100%)	18 (85.71%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (42.86%)	0 (0%)	3 (14.29%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (33.33%)	14 (66.67%)	21 (32.26%)
Heroin both smoked and injected	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Heroin Total Use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (82.35%)	44 (97.77%)	58 (93.54%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (17.65%)	1 (2.23%)	4 (6.46%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (27.41%)	45 (72.59%)	62 (13.3%)
Ketamine Sniffed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	6 (100%)	7 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (14.28%)	6 (85.72%)	7 (87.5%)
Ketamine Swallowed	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)	1 (12.5%)
Ketamine Total use	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	6 (100%)	8 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (25%)	6 (75%)	8 (17.1%)
Cannabis Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (87.5%)	16 (94.11%)	23 (92%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (12.5%)	1 (5.89%)	2 (8%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (32%)	17 (68%)	25 (53.6%)
Alcohol Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	7 (77.77%)	40 (97.56%)	49 (94.23%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (22.23%)	1 (2.44%)	3 (5.77%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	2 (3.84%)	9 (17.3%)	41 (78.86%)	52 (11.15%)
Sedative total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	1 (100%)	1 (16.66%)	2 (40%)	4 (33.33%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (83.34%)	3 (60%)	8 (66.67%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	1 (8.33%)	6 (50%)	5 (41.67%)	12 (25.7%)
Mixed drug Total	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (66.66%)	11 (100%)	13 (92.85%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.34%)	0 (0%)	1 (7.15%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (17.64%)	11 (78.58%)	14 (3.00%)
Other	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)	2 (100%)	4 (100%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (50%)	2 (50%)	4 (0.85%)
Blood Selling	Boys	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (66.66%)	14 (100%)	16 (94.11%)
	Girls	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.34%)	0 (0%)	1 (5.89%)
	Total	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (17.64%)	14 (82.36%)	17 (4.0%)

COMMENTS

Glue

Glue use has decreased by 6.2% over 2004, and now represents 33.69% of substance use in this group. This reflects a general trend in reduction since 2002 since Amphetamines and Heroin have become established in this group.

Despite the decrease in glue use, the level of use among females has increased slightly over 2004.

Amphetamines

Amphetamine use in this group has decreased slightly over 2004, but still remains the most common substance used (51.5%). The decrease in Amphetamines appears directly attributable to a rise in heroin use.

Injecting of Amphetamines, still prevalent in 2004, has no presence in the 2005 survey.

Heroin

Heroin use has increased from 5.1% in 2004 to 13.3% in 2005 and is establishing strongly in this group. Injecting of Heroin, already the most prevalent method of intake, has increased by 14.84% over 2004 to 67.74%.

Ketamine

Ketamine use, as in other groups, has reduced over 2004.

Cannabis

Cannabis use has reduced significantly over 2004 in line with the total substance using population.

Alcohol

Alcohol use has reduced very significantly over 2004 and previous years, and reflects the general trend in 2005.

Pharmacy drugs


Use of Pharmacy drugs has decreased compared with 2004 and reflects the general trend

Combined substance use

Blood selling

Blood selling has reduced in this group over 2004 but incremental evidence suggests that those that are selling their blood are doing so more often


អង្គការមិត្តសំឡាញ់



ការអន្តេតអំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងចំណោមក្រុមយុវវ័យ
រស់នៅក្នុងតំបន់កំពង់ចាម

រៀបចំឡើងដោយបុគ្គលិកកម្មវិធីគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥

ឧបត្ថម្ភដោយ :



អង្គការមិត្តសំឡាញ់



ការអន្តេតអំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងចំណោមក្រុមយុវវ័យ
រស់តាមថ្នល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

រៀបចំឡើងដោយបុគ្គលិកកម្មវិធីគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥

ឧបត្ថម្ភដោយ :



កំណត់សំគាល់សំខាន់ៗ

របាយការណ៍នេះគ្របដណ្តប់ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងចំណោមកុមាររស់តាមផ្ទះ និងក្រុមយុវវ័យដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ ។ ជាការពិតណាស់ វាគ្រាន់តែជាជ្រុងមួយនៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះថាយើងមិនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពក្នុងចំណោមក្រុមយុវវ័យផ្សេងទៀតទេ ដែលក្រុមទាំងនេះក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដ៏សំខាន់ផងដែរ (ក្រុមបងធំ កុមារចូលសាលា និងស្វិតមហាវិទ្យាល័យ ។ល។) ហើយក៏មិនបានលើកឡើងពី ស្ថានភាពក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សពេញវ័យដែរ ។

ដូច្នេះ វាប្រាកដជាបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើការអង្កេតនេះត្រូវបានប្រើ ដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើកុមាររស់តាមផ្ទះ និងក្រុមយុវវ័យដែលងាយរងគ្រោះ អំពីការប្រើគ្រឿងញៀន នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា ពីព្រោះនេះគឺជាឱកាសការទូទៅមួយ ។

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

**ការអង្កេតនេះអាចដំណើរការទៅបាន គឺអាស្រ័យដោយសារមានការចូលរួមវិភាគទានពីសមាជិកក្រុម
ការងាររបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ខាងក្រោម ដែលបានខិតខំអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួន ៖**

ក្រុមបំណិនជីវិត : លោក ម៉ាន ផល្លី (ប្រធានក្រុម), លោក ស៊ីត វិន, លោក ធី សុវណ្ណ, លោក ស៊ាង
សំណាង, លោក នៅ ចាន់ធួ និង កញ្ញា មនោ សុភាព ។

ក្រុមចុះថ្នល់ : លោក ពិន សុខុម (ប្រធានក្រុម), លោកស្រី នៅ ផល្លា, លោក សុខ សុផេន, លោក ម៉ក់
វិទ្យា, លោក សិន សាគុណ, លោក ទុយ ពុទ្ធា, លោក ហ៊ុន វិទ្យា, លោក ញឹក ទុំ, លោក ខុន សីហា, លោកស្រី វិន
សុផាន់ណារី, លោកស្រី ហង្ស សូត្រ, អ្នកនាង ខាន់ ចរិយា, អ្នកនាង សន សុភ័ក្ត្រ, លោក ឆិន កុសល, លោក តាន់
ភិចធ័រ , លោក អ៊ឹម ខន, លោក គី វិទ្យា និង លោក កែវ សោភ័ណ ។

ក្រុមគ្រឿងញៀន : លោក អ៊ូច ប៉ាត់ អមតៈ (ប្រធានក្រុម), លោក ផាន់ សង្ហា, លោក នូវ ពុទ្ធី, លោក
ឈឿន ប៊ុនរឿន, លោកស្រី ថោង ចន្ទ័ន, លោកស្រី ឈឹម វុទ្ធា, លោក ហាក់ រស្មី , កញ្ញា អ៊ឹម សក្កដា និង
លោក វង្ស ភគិនី ។

ក្រុមរកកន្លែង : លោកស្រី អ៊ឹម ស្រីពៅ (ប្រធានក្រុម), កញ្ញា ជា ម៉ារ៉ា, អ្នកនាង ទួន ដានី, អ្នកនាង
ឡឹក ពៅគង្គា, លោក សែម សន្យុកុសល, លោក អ៊ុង វ៉ាន់នី, លោក យួន យន្ត, លោក ប៉ែន ចាន់នៅ, លោក ឡុង
ដែន និង លោក ឈឿន ផល្លី ។

ក្រុមគាំទ្រអ្នករងគ្រោះដោយសារមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ : លោកស្រី ឡូច ពៅ (ប្រធានក្រុម),
លោក សន វុត្តា, លោក តេង ចាន់ ធានី, កញ្ញា អ៊ឹម យ៉ាវ៉ែន, កញ្ញា សេង ស្រី, និងលោក ជិម ម៉ានីន ។

ក្រុមការពារសិទ្ធិកុមារ : កញ្ញា ខ្ញុំ ចាន់ធីតា (ប្រធានក្រុម), លោក សែន សេនី, កញ្ញា ជ័យ ផល្លា ។

ក្រុមចំណាកស្រុកមានសុវត្ថិភាព : កញ្ញា គង់ សត្យា (ប្រធានក្រុម), លោកស្រី ហ៊ាង សុផល, កញ្ញា
តាង សុខ ណា ។

សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះ **លោក ពិន សុខុម និង លោក ម៉ាន ផល្លី** សំរាប់ការខិតខំប្រឹង
ប្រែងលើការសម្របសម្រួលរបស់ខ្លួន ។

ក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ លោក Sébastien Marot, លោក David Harding.

វិធីសាស្ត្រ

ការអង្កេតនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ជាមួយកុមារ/យុវវ័យចំនួនបីក្រុម :

- កុមារពុំមានការទំនុកបំរុង និងរស់នៅតែឯងនៅតាមផ្ទះរាជធានីភ្នំពេញ
- កុមាររស់តាមផ្ទះជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ
- កុមាររស់នៅក្នុងសហគមន៍ និងធ្វើការតាមផ្ទះ

កម្រងសំណួរនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាលើភាពអនាមិកទាំងស្រុងដល់កុមារដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតនេះ (ពុំមានសរសេរឈ្មោះ ឬ ទីតាំងជាក់លាក់) ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន រួមមាន : អាយុ និងភេទ ចំនួនសារធាតុញៀនដែលបានប្រើ និងប្រភេទសារធាតុញៀនដែលបានប្រើ, វិធីប្រើថ្នាំ និងសំណួរទាក់ទងនឹងការលក់ឈាម ។

រាល់កំណត់សំគាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងអស់ សុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការអង្កេតមុនៗ : (ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៩ , ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០, ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១, ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០២ និង ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤) ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យតាមដានពីនិន្នាការ និងការវិវឌ្ឍន៍នៃទម្លាប់ប្រើសារធាតុញៀន, ពុំមានការប្រៀបធៀបជាមួយព័ត៌មានណាមួយដែលបានប្រមូលនៅឆ្នាំ២០០៣ ឡើយ ពីព្រោះក្រុមគោលដៅបានទទួលរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ ដែលបានធ្វើឡើងនៅខែកក្កដា ដូច្នេះហើយធ្វើឱ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ ដើម្បីធានាឱ្យមានការប្រៀបធៀបជាមួយការអង្កេតមុនៗ គេបានកំណត់យកប្រភេទសារធាតុញៀនដែល : ការ, ATS (ថ្នាំយ៉ាម៉ា/យ៉ាបា) លេប ឬ ជក់, ចាក់ (ដូចជា ហេរ៉ូអ៊ីន និង ATS), ថ្នាំរម្ងាប់អារម្មណ៍តានតឹង (Valium, Reduxen), គ្រឿងស្រវឹង និង " ផ្សែងទៀត", កញ្ចាស្នូត (Cannabis), ស្រាខក់ថែល, ថ្នាំញៀនលាយជាមួយស្រា, សាំង ។ល។ , ការអង្កេតនេះ មិនរៀបរាប់អំពីបារីទេ ។

- កុមារ/យុវវ័យរស់នៅតាមផ្ទះ ត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេទ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបរស់នៅផ្សេងៗគ្នារបស់ពួកគេ។ កុមារទាំងនេះ គឺជាកុមាររស់នៅតាមផ្ទះដែលគ្មានការទំនុកបំរុងពីអាណាព្យាបាល និងកុមាររស់តាមផ្ទះជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។
- ផ្នែកដែលនិយាយអំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃសារធាតុញៀន រួមមាន ប្រភេទសារធាតុញៀនដែលចាក់តាមសរសៃ (ការអង្កេតមុនឆ្នាំ២០០៤ ពណ៌នាតែ "ការប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ប៉ុណ្ណោះ") ។
- ផ្នែកដែលនិយាយអំពី "ប្រភេទសារធាតុញៀនដែលបានប្រើ" រួមមាន វិធីប្រើសារធាតុញៀននីមួយៗ ដែលគេដឹងជាទូទៅ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការចាក់ ការជក់/ "ប៊ីត", ការស្រូបចូល ។ល។
- គ្មានការផ្លាស់ប្តូរទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការអង្កេតឆ្នាំ២០០៤ ទេ ។

ការអង្កេតនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកនៃក្រុមគ្រឿងញៀន និងក្រុមចុះផ្ទុះច្បាប់របស់ អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ដោយសហការជាមួយបុគ្គលិកនៃក្រុមបំណិនជីវិត និងក្រុមសមាហរណកម្ម ដែលធ្វើការជាមួយក្រុមយុវវ័យនៅក្នុងសហគមន៍ ។

ការអង្កេតនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីចៀសវាងការធ្វើត្រួតគ្នា ពីព្រោះក្រុមគោលដៅ អាចផ្លាស់ទីកន្លែងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។

ក្រុមគោលដៅ

កុមារ/យុវវ័យរស់តាមផ្លូវសរុប

អាយុ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ក្មេងប្រុស	៨៤ (៦៤.១២%)	២១២ (៦៤.៦៣%)	៥០៩ (៦៨.៤១%)	៣៥០ (៧៨.៤៧%)	៥២៥ (៨៤.៤៤%)	១៦៨០ (៧៣.៩៧%)
ក្មេងស្រី	៤៧ (៣៥.៨៨%)	១១៦ (៣៥.៣៧%)	២៣៥ (៣១.៥៩%)	៩៦ (២១.៥៣%)	៩៧ (១៥.៦៤%)	៥៩១ (២៦.០៣%)
សរុប	១៣១ (៥០.០០%)	៣២៨ (១០០.០០%)	៧៤៤ (៣១.៧៦%)	៤៤៦ (១៩.០០%)	៦២២ (២៦.៤១%)	២២៧១

កុមារ/យុវវ័យរស់តាមផ្លូវតែម្នាក់ឯងសរុប

អាយុ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ក្មេងប្រុស	៨ (៦៦.៦៦%)	២៦ (៧២.២២%)	៥២ (៨០.៧៦%)	១៣៤ (៨៨.៧៤%)	២៦៨ (៨៦.១៧%)	៥២៨ (៨៤.៧៤%)
ក្មេងស្រី	៤ (៣៣.៣៣%)	៩ (២៧.៧៧%)	២២ (១៩.២៤%)	១៧ (១១.២៦%)	៤៣ (១៣.៨៣%)	៩៥ (១៥.២៦%)
សរុប	១២ (១០.០០%)	៣៥ (៥០.០០%)	៧៤ (១០០.០០%)	១៥១ (១០០.០០%)	៣១១ (១០០.០០%)	៦២៣ (១០០.០០%)

កុមារ/យុវវ័យរស់តាមផ្លូវជាមួយគ្រួសារសរុប

អាយុ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ក្មេងប្រុស	៣២ (៦០.៣៧%)	៤៦ (៥០.០០%)	៧៥ (៥៩.៥២%)	៣៨ (៧៧.៥៥%)	២៥ (៧៣.៥២%)	២១៦ (៦២.៧៩%)
ក្មេងស្រី	២១ (៣៩.៦៣%)	៣៦ (៤០.០០%)	៥១ (៤០.៤៨%)	១១ (២២.៤៥%)	៩ (២៦.៤៨%)	១២៨ (៣៧.២១%)
សរុប	៥៣ (១០០.០០%)	៨២ (១០០.០០%)	១២៦ (១០០.០០%)	៤៩ (១០០.០០%)	៣៤ (១០០.០០%)	៣៤៤ (១០០.០០%)

កុមារ/យុវវ័យធ្វើការតាមផ្លូវសរុប

អាយុ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ក្មេងប្រុស	៤៤ (៦៦.៦៦%)	១៤០ (៦៦.៣៥%)	៣៤២ (៦៧.៨៥%)	១៧៨ (៧២.៣៥%)	២៣២ (៨៣.៧៥%)	៩៣៦ (៧៩.៧៥%)
ក្មេងស្រី	២២ (៣៣.៣៣%)	៧១ (៣៣.៦៥%)	១៦២ (៣២.១៥%)	៦៨ (២៧.៦៥%)	៤៥ (១៦.២៥%)	៣៦៨ (៣១.២៥%)
សរុប	៦៦ (១០០.០០%)	២១១ (១០០.០០%)	៥០៤ (១០០.០០%)	២៤៦ (១០០.០០%)	២៧៧ (១០០.០០%)	១៣០៤ (១០០.០០%)

កំណត់សំគាល់

ចំនួនកុមារ និងយុវវ័យដែលបានទាក់ទងនៅក្នុងការអង្កេតនេះ បានលើសចំនួនដែលបានសម្ភាសន៍ នៅក្នុងការអង្កេតអំពីការប្រើសារធាតុញៀនមុនៗ ដែលបានចាប់ផ្តើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ។ ក្រុមគោលដៅមុនៗ ដែលបានទាក់ទងច្រើនបំផុតមានចំនួន ១.៨៤៣ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០២. តួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំង ពីការកើនឡើងនូវ សមត្ថភាពរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ក្នុងការចុះទំនាក់ទំនងជាមួយកុមាររស់តាមផ្ទះ ។

ការកើនឡើងនូវក្រុមគំរូដែលបានសម្ភាសន៍ ទំនងដូចជាស្របទៅតាមក្រុមអាយុ លើកលែងក្រុមអាយុច្រើនជាងគេ (១៩-២៣) ដែលស្ទើរតែកើនឡើងទ្វេ អំឡុងឆ្នាំ ២០០៤ នេះ។ ក្រុមអាយុនេះ មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង នៅអំឡុងឆ្នាំ២០០៤ ដោយសារតែមានប្រតិបត្តិការចាប់ប្រមូលពីសំណាក់អាជ្ញាធរ បើទោះជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងចំណោមយុវវ័យរស់តាមផ្ទះ កាលពីខែដំបូង នៃឆ្នាំ២០០៥ ក៏ដោយ។ មានសកម្មភាពតិចតួចណាស់នៅពេលធ្វើអង្កេត ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេកាន់តែងាយប្រទះឃើញក្រុមយុវវ័យច្រើនជាងមុន។ មានការកើនឡើងទាំងចំនួនក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ដែលគេបានប្រទះឃើញ ថ្វីបើអត្រាកំណើនចំពោះក្មេងស្រី (៤១.៣% កំឡុងឆ្នាំ ២០០៤) គឺខ្ពស់ជាងក្មេងប្រុសក៏ដោយ (៣០.៧%) ។

ចំនួនកុមារ និងយុវវ័យរស់នៅតាមផ្ទះតែឯង ដែលបានទាក់ទង កុមាររស់នៅតាមផ្ទះជាមួយ គ្រួសារ និងកុមារធ្វើការតាមផ្ទះ សុទ្ធតែបានកើនឡើង នៅឆ្នាំមុនៗនេះ បើទោះបីជាមានការកើនឡើងខ្ពស់ បំផុត (ជិតពីរដង) ចំពោះក្មេងដែលរស់នៅតាមផ្ទះតែម្នាក់ឯងក៏ដោយ ។

ចំនួនកុមារ/យុវវ័យរស់តាមថ្នាក់សរុប

ការប្រើសារធាតុញៀនតែមួយប្រភេទ និងច្រើនប្រភេទ

	ភេទ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន (សរុប)	ក្មេងប្រុស	១៧ (៩៤.៤៤%)	៥៧ (៩៣.៤៤%)	១៥៤ (៩២.៧៧%)	២៣៧ (៨៦.១៨%)	៤៧៣ (៨៨.៧៤%)	៩៣៨ (៨៩.០៧%)
	ក្មេងស្រី	១ (៥.៥៦%)	៤ (៦.៥៦%)	១២ (៧.២៣%)	៣៨ (១៣.៨២%)	៦០ (១១.២៦%)	១១៥ (១០.៩៣%)
	សរុប	១៨ (១០០%)	៦១ (១០០%)	១៦៦ (១០០%)	២៧៥ (១០០%)	៥៣៣ (១០០%)	១០៥៣ (១០០%)
ការប្រើសារធាតុញៀន ១ ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	១៦ (៩៤.១១%)	៥៥ (៩៣.២២%)	១១៤ (៩១.២៥%)	១៣២ (៨៦.៥៥%)	២៣២ (៨៧.៥៤%)	៥៤៩ (៨៧.៦៩%)
	ក្មេងស្រី	១ (៥.៨៩%)	៤ (៦.៧៨%)	១១ (៨.៧៥%)	២៨ (១៧.៤៥%)	២៧ (៩.៩៦%)	៧១ (១២.៣១%)
	សរុប	១៧ (១០០%)	៥៩ (១០០%)	១២៥ (១០០%)	១៦០ (១០០%)	២៥៩ (១០០%)	៥២០ (១០០%)
ការប្រើសារធាតុញៀន ២ ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	១ (១០០%)	២ (១០០%)	៣៧ (៩៧.៣៦%)	៧៧ (៩១.៦៦%)	១៤០ (៩០.៩៥%)	២៥៧ (៩៧.១១%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (២.៦៤%)	៧ (៨.៣៣%)	១៤ (៨.០៤%)	២២ (៨.០៤%)
	សរុប	១ (១០០%)	២ (១០០%)	៣៨ (១០០%)	៨៤ (១០០%)	១៥៤ (១០០%)	២៧៩ (១០០%)
ការប្រើសារធាតុញៀន ៣ ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២២ (៩៥.៦៥%)	៧៩ (៨៦.៨១%)	១០៣ (៨៨.៧៩%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៤.៣៥%)	១២ (១៣.១៩%)	១៣ (១១.២១%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២៣ (១០០%)	៩១ (១០០%)	១១៦ (១០០%)
ការប្រើសារធាតុញៀន ៤ ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៦ (៨៥.៧១%)	១៧ (៩៤.៤៤%)	២៤ (៩២.៣១%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១៤.២៩%)	១ (៥.៥៦%)	២ (៧.៦៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៧ (១០០%)	១៨ (១០០%)	២៦ (១០០%)
ការប្រើសារធាតុញៀន ៥ ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (១០០%)	៥ (៨៣.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១៦.៦៧%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៥ (១០០%)	៦ (១០០%)

កំណត់សំគាល់

ចំនួនសរុបនៃយុវវ័យរស់តាមថ្នល់ ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលបានរកឃើញ គឺមានចំនួន ១.០៥៣ នាក់ ដែលតំណាងឱ្យ ៤៦.៣៦ % នៃចំនួនសរុប (ឬ ជិតពាក់កណ្តាលនៃ) ចំនួនមនុស្ស។ ពីមុន មានតែ ចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅតាមថ្នល់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានគេប្រមូល និង នៅឆ្នាំ ២០០៤ បានបង្ហាញពី ៥០.៧ % នៃការកើតមានករណីប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន (សូមមើលផ្នែកខាងក្រោម) ។

នៅក្នុងចំនួនក្រុមគោលដៅជិត ៩០% នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន គឺជាក្មេងប្រុសដែលមិនសមាមាត្រ ទៅនឹងផលធៀបរវាងក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ដែលរស់នៅតាមថ្នល់ (៧៤ % ប្រុស. ២៦ % ស្រី) ហើយបង្ហាញថា ការប្រើសារធាតុញៀននេះ កំពុងកើនឡើងកាន់តែឆាប់រហ័ស នៅក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស ជាងក្មេងស្រី។ យុវវ័យ រស់តាមថ្នល់ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនភាគច្រើន គឺកំពុងប្រើសារធាតុញៀនតែមួយប្រភេទ (៥៩.៤៤ %) ប៉ុន្តែការ ប្រើសារធាតុញៀនច្រើនប្រភេទនោះ ហាក់ដូចជាឃើញមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុមក្មេង និងយុវវ័យ រស់តាមថ្នល់ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពរស់នៅតាមថ្នល់ ដែលមានលក្ខណៈអនាធិបតេយ្យ និង ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាង ឆាប់រហ័ស និងលក្ខណៈប្រែប្រួលនៃទម្លាប់ នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដែលកំពុងតែរីកដុះដាល។ ចំនែកឯការ ផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់ សារធាតុញៀនច្រើនប្រភេទ នៅក្នុងក្រុមអាយុចាស់ជាងគេ បង្ហាញឱ្យដឹងថាវាមាន ទំនាក់ទំនងទៅ យន្តការផ្សេងៗ ដូចជាលទ្ធភាពកម្រិតចំណូល ធ្វើការចល័ត និង ទៅនឹងស្ថានភាព ពីព្រោះមនុស្ស ក្មេងពេញវ័យ ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន គឺអាចរកឃើញកាន់តែច្រើន។

ចំនួនគុណ/យុទ្ធវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារ

ប្រភេទសារធាតុភ្លៀងដែលបានប្រើ និងវិធីប្រើប្រាស់

ប្រភេទសារធាតុ ភ្លៀង/ការប្រើប្រាស់	កេរ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការហិត	ក្នុងប្រុស	១០ (៩០.៩%)	៤៦ (៩៣.៨៧%)	១០៩ (៩៥.៦១%)	៩៧ (៩៥.០៩%)	៧២ (៩១.១៣%)	៣៣៤ (៩៤.៨៨%)
	ក្នុងស្រី	១ (៩.១%)	៣ (៦.១៣%)	៥ (៤.៣៩%)	៥ (៤.៩១%)	៤ (៥.០៧%)	១៨ (៥.១២%)
	សរុប	១១ (៣.១២%)	៤៩ (១៣.០០%)	១១៤ (៣០.០០%)	១០២ (២៨.០០%)	៧៦ (២១.៦៦%)	៣៥២ (៣០.០០%)
ATS លេប(យ៉ាម៉ា)	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ចាក់(យ៉ាម៉ា)	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (០.១៦%)
ATS ប្រភេទជក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្នុងប្រុស	២ (១០០%)	៣ (១០០%)	៦៦ (៩៣.៩៣%)	១៦៩ (៩០.៨៦%)	៣៤៦ (៨៨.៤៩%)	៥៨៦ (៨៩.៩៩%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៦.០៧%)	១៧ (៩.១៤%)	៤៤ (១១.២៩%)	៦៥ (១០.០៥%)
	សរុប	២ (០.៣២%)	៣ (០.៤៦%)	៧០ (១០.០០%)	១៨៦ (២៨.០០%)	៣៩០ (៦០.០០%)	៦៥១ (៩០.០៤%)
ការប្រើប្រាស់ ATS សរុប (យ៉ាម៉ា)	ក្នុងប្រុស	២ (១០០%)	៣ (១០០%)	៦៦ (៩៣.៩៣%)	១៦៩ (៩០.៨៦%)	៣៤៦ (៨៨.៧១%)	៥៨៦ (៩០.៩៩%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៦.០៣%)	១៧ (៩.១៤%)	៤៤ (១១.៥១%)	៦៥ (១០.១៩%)
	សរុប	២ (០.៣២%)	៣ (០.៤៦%)	៧០ (១០.០០%)	១៨៦ (២៨.០០%)	៣៩០ (៦០.០០%)	៦៥១ (៩០.១៨%)
ហ្វូអ៊ីន ប្រភេទចាក់	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	១៧ (៩៤.៤៤%)	១១៨ (៩៥.១៦%)	១៣៨ (៩៥.១៧%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥.៥៦%)	៦ (៤.៨៤%)	៧ (៥.០៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៣ (២.០៦%)	១៨ (១០.០០%)	១២៤ (៨៥.៥៣%)	១៤៥ (១០.២០%)
ហ្វូអ៊ីនជក់	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	១៩ (៧៦%)	៤២ (៩៣.៣៣%)	៦៥ (៨៧.៨៣%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៦ (២៤%)	៣ (៦.៦៧%)	៩ (១២.១៧%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៥.៤៤%)	២៥ (៣៣.៣៣%)	៤៥ (៦០.០០%)	៧៤ (៩០.០០%)
ហ្វូអ៊ីនជក់ និងចាក់	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៣ (១០០%)	៣១ (១០០%)	៣៥ (១០០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (២.៨៦%)	៣ (៨.៥៧%)	៣១ (៨៨.៥៧%)	៣៥ (១០.០០%)
ការប្រើប្រាស់ ហ្វូអ៊ីនសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៧ (១០០%)	៣៦ (៨៣.៣៣%)	១៦០ (៩៤.៦៧%)	២០៣ (៩៥.០០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៧ (១៦.៦៧%)	៩ (៥.៣៣%)	១៦ (៧.៣៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៧ (៣.១២%)	៤៣ (១៦.៦៧%)	១៦៩ (៦០.០០%)	២១៩ (៣០.០០%)
កេតាមីនហិត	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៩ (៩០%)	១០ (៩០.៩%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០%)	១ (៩.១%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៩.១%)	១០ (៩០.៩%)	១១ (៨០.០០%)
កេតាមីនលេប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)	២ (១០០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥០%)	១ (៥០%)	២ (១៥.៣៩%)
ការប្រើប្រាស់កេតាមីនសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	១០ (៩០.៩%)	១២ (៩២.៣៩%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៩.១%)	១ (៧.៦១%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១៥.៣៩%)	១១ (៨៤.៦១%)	១៣ (១០.០០%)
កញ្ចក់កាណាប៊ីសសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១៣ (៩២.៨៥%)	៤០ (៩៣.០២%)	៥៣ (៩២.៨៥%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៧.១៤%)	៣ (៦.៩៨%)	៤ (៧.១៤%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១៤ (១០.០០%)	៤៣ (៣០.០០%)	៥៧ (៤០.០០%)
គ្រឿងស្រវឹងសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	១៩ (៩០.៤៧%)	៩៧ (៩៤.១៧%)	១២០ (៩៣.៦៤%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៩.៥២%)	៦ (៥.៨៣%)	៨ (៦.៣៦%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៣.១២%)	២១ (១០.០០%)	១០៣ (៣០.០០%)	១២៨ (៣០.០០%)
ផ្ទាំងមូលដ្ឋានសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៤ (៤៤.៤៤%)	១៥ (៧៥.៥៦%)	២០ (៦៤.៥១%)

	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (៥៥.៥៦%)	៦ (៦៨.៥៨%)	១១ (៣៥.៤៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣.២២%)	៩ (៦៥.០៤%)	៦១ (៦៧.៧៤%)	៣១ (២.៩៤%)
ថ្នាំចម្រុះសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	៤ (៦៦.៦៦%)	៣៤ (៩៤.៤៤%)	៤០ (៩០.៩៩%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៣៣.៣៣%)	២ (៥.៥៦%)	៤ (៩.១%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	២ (៤.៥៤%)	៦ (១៣.៦៣%)	៣៦ (៨០.៨៣%)	៤៤ (៤.១៧%)
ផ្សេងៗ	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	៤ (៧៥%)	៨ (៨៨.៨៨%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២៥%)	១ (១១.១១%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៤៤.៤៤%)	៥ (៥៥.៥៦%)	៩ (០.៨៦%)
ការលក់ឈាម	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៨ (៨៨.៨៨%)	៦៣ (៩៦.៩៦%)	៧១ (៩៥.៩៤%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១១.១១%)	២ (៣.០៨%)	៣ (៤.០៦%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៩ (១១.១១%)	៦៥ (៨៧.៨៤%)	៧៤ (៧.០៦%)

កំណត់សំគាល់

នៅក្នុងចំនួនក្រុមគោលដៅទាំងអស់ សារធាតុព្យៀនប្រភេទអំប៊ូតាមីន (យ៉ាម៉ា) នៅតែជាសារធាតុព្យៀនទូទៅជាងគេ ដែលប្រើដោយយុវវ័យរស់តាមផ្ទាល់ (៦១.៥%) បន្ទាប់មកទៀត គឺ ការវិបត្តិ (៣៣.៤២%) និង ថ្នាំហ្សូអ៊ីន (២០.៧៩%) ។

ការដក់សារធាតុព្យៀន ត្រូវបានបង្ហាញថាជាវិធីដែលគេនិយមប្រើបំផុត (៧៣.៨%) បន្ទាប់មក គឺការវិបត្តិ (៣៤.៤%) ការស្រូបចូល (១៥.២% ពិសេស គ្រឿងស្រវឹង) និង ការចាក់ ១៣.៩% ។

ការប្រើថ្នាំចាក់ ស្ថិតក្នុងកំរិតមួយគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ដោយសារតែវាបង្ហាញពីការកើនឡើង ៤.១% ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ២០០៤ (៩.៨%) ។

ការហិត

ការប្រើប្រាស់ការហិត បានថយចុះបើធៀបនឹង ឆ្នាំ២០០៥ ពី ៥១,៤% នៃចំនួនអ្នកប្រើសារធាតុញៀន ដល់ ៣៤,២% នៅឆ្នាំ ២០០៥ ដែលការនេះបង្ហាញថាថ្នាំអំប៊ូតាមីនកំពុងតែត្រូវបានប្រើច្រើនជាងគេ ហើយ ហ្សូអ៊ីនក៏ជាថ្នាំដែលក្រុមយុវវ័យចូលចិត្តប្រើខ្លាំងផងដែរ. ការប្រើការហិត បានថយចុះគួរអោយកត់សំគាល់ក្នុង ចំណោមក្រុមដែលមានអាយុច្រើន ខណៈដែលមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមក្រុមយុវវ័យ ដែលការណ៍នេះបង្ហាញ ថាវាកំពុងតែក្លាយជាថ្នាំ “នាំចូល” ដ៏ចំបងមួយ សំរាប់ក្មេងៗ ចំណែកឯការប្រើការហិតក្នុងចំណោមក្មេងស្រីនៅ គ្រប់ក្រុមអាយុទាំងអស់ បានបន្តថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ (ការប្រើការហិតកើតមានជាទូទៅខ្លាំងជាង ក្នុងចំណោម ក្មេងប្រុស) ។

ថ្នាំអំប៊ូតាមីន (យ៉ាម៉ា)

ការប្រើថ្នាំអំប៊ូតាមីន មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ពីមានការដាក់លក់ជាលើកដំបូងនៅតាមដង វិថីក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ហើយនិន្នាការនេះកំពុងតែបន្តកើនឡើង ៧% ចំពោះការប្រើថ្នាំអំប៊ូតាមីន ក្នុងចំណោមក្រុម យុវវ័យរស់តាមផ្ទះ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៤ ។

ការប្រើថ្នាំអំប៊ូតាមីន បានកើនឡើងនៅទូទាំងក្រុមអាយុទាំងអស់ ដោយរួមទាំងក្រុមអាយុដែលក្មេង ជាងគេ (០-៨ឆ្នាំ) ដែលចាប់ផ្តើមប្រើជាលើកដំបូង។ កំណើនច្រើនបំផុត គឺកើតឡើងក្នុងចំណោមក្រុមអាយុដែល មានអាយុច្រើនជាង ហើយនៅកំរិតនេះថ្នាំអំប៊ូតាមីន ត្រូវបានបន្តប្រើជំនួសការហិត ដែលជាសារធាតុញៀនដែល គេនិយមប្រើបំផុត ។

ការប្រើថ្នាំអំប៊ូតាមីន បានកើនឡើងក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ប៉ុន្តែចំពោះការប្រើសារធាតុ ផ្សេងទៀត អត្រាកំណើន មានកំរិតខ្ពស់ជាងក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងប្រុស ។

ហ្សូអ៊ីន

ការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីនក្នុងចំណោមក្រុមយុវវ័យរស់តាមផ្ទះ បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សំគាល់នៅឆ្នាំ២០០៤ នៅពេលដែលអត្រាប្រើថ្នាំនេះ បានកើនពី ៧,២% ដល់ ២០,៧៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ។ តួលេខនេះតំណាងឱ្យការកើន ឡើងច្រើនបំផុតចំពោះការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន ចាប់តាំងពីបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ២០០០ និងបង្ហាញថាថ្នាំ នេះអាចរកទិញបានយ៉ាងងាយ និងនិយមប្រើយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមផ្ទះ ។

ការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន បានកើនឡើងក្នុងចំណោមក្រុមអាយុទាំងអស់ ប៉ុន្តែ ជាថ្មីម្តងទៀត ការកើនឡើងនេះ បានកើតឡើងខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមអាយុដែលមានអាយុច្រើនជាង ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន មានកំរិតទាប ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដែលការណ៍នេះបង្ហាញថាថ្នាំអំប៊ូតាមីន គឺជាថ្នាំដែលក្មេងស្រីចូលចិត្តប្រើ ជាង ។ បញ្ហានេះ អាចបណ្តាលមកពីកត្តាមួយចំនួន ដូចជា វប្បធម៌ ស្ថានភាព និងការយល់ឃើញរបស់បុគ្គល ។

មុនឆ្នាំ២០០៥ វិធីប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីនដ៏ចម្រើន គឺតាមរយៈការជក់/ការប៊ីត។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ៤២.៨% នៃអ្នកប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន គឺតាមរយៈការចាក់បញ្ចូល។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ កំរិតនៃការចាក់ថ្នាំបញ្ចូលក្នុងចំណោមអ្នកប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន បានកើនឡើងដល់ ៦៦.២% ហើយបច្ចុប្បន្ន វាគឺជាវិធីប្រើដ៏ចម្រើនមួយ។

ការប្រើថ្នាំតាមការចាក់ បានកើនឡើងក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុស ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីន ជាទូទៅ ការកើនឡើងច្រើនបំផុតតាមរយៈការចាក់ គឺកើតឡើងក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងស្រីដែលមានអាយុច្រើនជាងគេ។

ថ្នាំកេតាមីន

ការប្រើថ្នាំកេតាមីន នៅតែកើតចេញពីទម្លាប់នៃការប្រើសារធាតុញៀន ប៉ុន្តែការប្រើថ្នាំនេះបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំមុនៗ។

កញ្ឆាស្លាកកាណាប៊ីស (Cannabis)

ការប្រើកញ្ឆាស្លាកកាណាប៊ីស បានថយចុះនៅឆ្នាំ២០០៤ (ចំនួន ៨.៣%)។ ការប្រើកញ្ឆាស្លាកកាណាប៊ីសតែមួយមុខ ពុំមានការនិយមប្រើខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមកុមាររស់តាមផ្ទះតែឯងទេ (ពុំសូវមានគេស្គាល់, ចំណាយធៀបនឹងឥទ្ធិពល) ប៉ុន្តែជារឿយៗ វាត្រូវបានប្រើផ្សំជាមួយថ្នាំហ្សូអ៊ីននៅពេលជក់។ ការថយចុះនៃការប្រើកញ្ឆាស្លាកកាណាប៊ីស អាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើថ្នាំហ្សូអ៊ីនតាមការចាក់ (គេមិនប្រើកញ្ឆាស្លាកកាណាប៊ីសតាមរយៈការចាក់ទេ)។

គ្រឿងស្រវឹង

ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំង (២៦.៣៥%) នៅឆ្នាំ២០០៤។ ជាញឹកញាប់ ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង តែងកើតឡើងជាទូទៅក្នុងចំណោមកុមារធ្វើការតាមផ្ទះ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយគ្រួសារ និងបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជាទូទៅមួយរវាងការប្រើគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមកុមារ និងអ្នកថែទាំ។ ការកើនឡើងនៃការប្រើថ្នាំអំប៊ូតាមីន និងហ្សូអ៊ីន ទំនងជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការប្រើគ្រឿងស្រវឹង ហើយការថយចុះនៃការប្រើគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមកុមារធ្វើការតាមផ្ទះ បង្ហាញឱ្យឃើញថាអ្នកថែទាំកុមារ ក៏ងាកចេញពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងដែរ និងឈានទៅរកការប្រើសារធាតុញៀនដទៃទៀត។

ថ្នាំតាមឱសថស្ថាន

ការប្រើថ្នាំតាមឱសថស្ថានមួយចំនួន (ភាគច្រើន ថ្នាំរម្ងាប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ ដូចជា ថ្នាំធ្លាក់ទឹកចិត្ត (benzodiazepines) បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ២០០៤ (ពី ៥% មកត្រឹម ២.៩៤%) ប៉ុន្តែបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងស្រី ដែលពុំបង្ហាញពីការប្រើថ្នាំតាមឱសថស្ថាន ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ (៣៥.៤% ក្នុងឆ្នាំ២០០៥)។ ការថយចុះនៃការប្រើថ្នាំតាមឱសថស្ថាន បង្ហាញឱ្យឃើញពីនិន្នាការផ្ទុយគ្នាពីរ ជុំវិញការប្រើសារធាតុ

ញៀនខុសច្បាប់ ដែលមានតម្លៃថោក និងងាយរកទិញនៅតាមផ្ទាល់ និងការប្រើថ្នាំតាមឱសថស្ថានដែលជាញឹកញាប់មានតម្លៃថ្លៃជាង និងពិបាកស្វែងរកប្រភព។ ការកើនឡើងនូវការប្រើថ្នាំតាមឱសថស្ថានក្នុងចំណោមក្មេងស្រីបានបង្ហាញឱ្យឃើញទៀតថា ទម្លាប់ប្រើសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង អាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុជាច្រើននៃការប្រើ និងអាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំង (រួមទាំងទម្លាប់នៃការប្រើ ថ្នាំ) ពីការយល់ឃើញនូវអ្វីដែលគេគិតថាការទង្វើបែបនោះវាសមស្របសំរាប់ក្មេងស្រី។

ការប្រើសារធាតុញៀនចម្រុះ

ការលាយសារធាតុញៀនលាយបញ្ចូលគ្នានៅពេលប្រើ បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ២០០៤ (ដល់ជាង ៤០%) បើទោះបីជាការផ្សំគ្រឿងញៀនបញ្ចូលគ្នា (ដូចជា ហេរ៉ូអ៊ីនជាមួយកញ្ឆាណាប៊ីស) ទំនងជាពុំសូវកើតមានក៏ដោយ។ ការនេះបង្ហាញថាមានការកើនឡើងនូវការលាយបញ្ចូលគ្នា រវាងថ្នាំបង្កើនកម្លាំង និងថ្នាំរម្ងាប់អារម្មណ៍ ដែលកើតមានជាទូទៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រើសារធាតុញៀន ដូចជា ថ្នាំអំហ្វេតាមីន និងហេរ៉ូអ៊ីនដែលជាវិធី ប្រើមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង។

គ្រឿងញៀនផ្សេងទៀត

គ្រឿងញៀនដទៃទៀត គឺជាប្រភេទគ្រឿងញៀនទាំងឡាយណាដែលអ្នកធ្វើសម្ភាសន៍មិនអាចកំណត់បានតាមរយៈការពណ៌នា ឬ ការផ្តល់ឈ្មោះដោយកុមារដែលបានសម្ភាសន៍។ កំរិតនៃគ្រឿងញៀនដែលមិនបានកំណត់ដែលបានបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ២០០៥ គឺមានភាពស្របគ្នាជាមួយគ្រឿងញៀនដែលមិនបានកំណត់នៅក្នុងការអង្កេតមុនៗដែរ។

ការលក់ឈាម

ចំនួនកុមារ និងយុវវ័យដែលលក់ឈាមក្នុងឆ្នាំ២០០៥ (៧៤នាក់) បានថយចុះជាងឆ្នាំ២០០៤ (៩០នាក់) ប៉ុន្តែតាមរយៈការចុះទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារតាមផ្ទាល់ដែលលក់ឈាម បង្ហាញឱ្យដឹងថាពួកគេបាននឹងកំពុងលក់ឈាមយ៉ាងញឹកញាប់ ហើយការចុះទំនាក់ទំនងដែលនេះដែរ បង្ហាញថា ជាញឹកញាប់ កុមារ និងយុវវ័យដែលលក់ឈាមរបស់ខ្លួន កំពុងតែប្រើសារធាតុយ៉ាងខ្លាំង ហើយមួយចំនួនធំគឺជាអ្នកប្រើសារធាតុញៀនតាមការចាក់ដែលជាវិធីមួយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ក្រុមអ្នកប្រើសារធាតុញៀនទូទៅ (ជាពិសេសអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនតាមការចាក់) ដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងតាមរយៈឈាម ដូចជា មេរោគ អេដស៍ ជាដើម។

កុមាររស់នៅតាមផ្ទះ

កុមារ/យុវវ័យរស់នៅតែម្តាយឯកតាមផ្ទះ

	ភេទ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការប្រើសាធារណៈ (សរុប)	ក្មេងប្រុស	១ (៥០%)	៧ (៨៧.៥%)	៥៨ (៩៣.៥៤%)	១០៦ (៨៥.៤៨%)	២៥៤ (៨៦.៣៩%)	៤២៦ (៨៦.៩៣%)
	ក្មេងស្រី	១ (៥០%)	១ (១២.៥%)	៤ (៦.៤៦%)	១៨ (១៤.៥២%)	៤០ (១៣.៦១%)	៦៤ (១៣.០៧%)
	សរុប	២ (០.៤%)	៨ (១០.០%)	៦២ (១០០.០%)	១២៤ (១០០.០%)	២៩៤ (១០០.០%)	៤៩០ (១០០.០%)
ការប្រើសាធារណៈ ១ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	១ (៥០%)	៥ (៨៣.៣៣%)	៣៧ (៩០.២៤)	៥១ (៨២.២៥%)	១០៧ (៨៦.៩៩%)	២០១ (៨៥.៨៩%)
	ក្មេងស្រី	១ (៥០%)	១ (១៦.៦៧%)	៤ (៩.៧៦%)	១១ (៩១.៧៦%)	១៦ (៩១.៧៦%)	៣៣ (៩០.១១%)
	សរុប	២ (០.៨៥%)	៦ (៦.៥៦%)	៤១ (៩០.០០%)	៦២ (៦៦.០៤%)	១២៣ (៩១.៧៥%)	២៣៤ (៩៧.០០%)
ការប្រើសាធារណៈ ២ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	២ (៩០.០០%)	១៩ (១០០%)	៣៧ (៨៦.០៤%)	៨៤ (៨៨.៤២%)	១៤២ (៨៩.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៦ (១៣.៥៦%)	១១ (១១.៥២%)	១៧ (១០.៧៦%)
	សរុប	០ (០%)	២ (១.០០%)	១៩ (១០០.០%)	៤៣ (៩៩.៦០%)	៩៥ (៩៩.៩៤%)	១៥៩ (៩៩.០៩%)
ការប្រើសាធារណៈ ៣ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១៤ (៩៣.៣៣%)	៥០ (៨០.៦៤%)	៦៥ (៨៣.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៦.៦៧%)	១២ (៧៦.៩២%)	១៣ (៨០.០០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១៥ (៩៩.៩៩%)	៦២ (៩៩.៩៩%)	៧៨ (៩៩.៩៩%)
ការប្រើសាធារណៈ ៤ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៤ (១០០%)	១០ (៩០.៩០%)	១៥ (៩៣.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៩.០៩%)	១ (៦.៦៧%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៤ (១០០%)	១១ (៩៩.៩៩%)	១៦ (៩៩.៩៩%)
ការប្រើសាធារណៈ ៥ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	៣ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	៣ (១០០%)

គុហារ/យុទ្ធវិធីសំរាប់ការបង្កើនជាមួយគ្រួសារ

	ភេទ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការប្រើ សាធារណៈ (សរុប)	ក្មេងប្រុស	៨ (១០០%)	៩ (៩០%)	២៤ (៨៨.៨៨%)	២៨ (១០០%)	១៩ (៧៩.១៦%)	៨៨ (៣៤.៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	១ (១០%)	៣ (១១.១២%)	០ (០%)	៥ (២៩.៨៤%)	៩ (៩.២៨%)
	សរុប	៨ (៨.២៤%)	១០ (១០.៣%)	២៧ (២៧.៨៣%)	២៨ (២៨.៨៦%)	២៤ (២៤.៧៧%)	៩៧ (៩.៦១%)
ការប្រើសា ធារណៈ ១ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	៧ (១០០%)	៩ (៩០%)	១៧ (៨៩.៤៧%)	១៩ (១០០%)	១២ (៧០.៥៨%)	៦៤ (៨៨.៨៨%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	១ (១០%)	២ (១០.៥៣%)	០ (០%)	៥ (២៩.៨៤%)	៨ (១១.១២%)
	សរុប	៧ (៩.៧២%)	១០ (១០.៨៨%)	១៩ (១៩.៥៦%)	១៩ (១៩.៣៨%)	១៧ (១៧.០៦%)	៧២ (៧.៦២%)
ការប្រើសា ធារណៈ ២ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	១ (១០០%)	០ (០%)	៧ (៨៧.៥%)	៧ (១០០%)	៥ (១០០%)	២០ (៩៥.២៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (១២.៥%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៤.៧៧%)
	សរុប	១ (៤.៧៦%)	០ (០%)	៨ (៨.៥៣%)	៧ (៧.៣៨%)	៥ (៥.០០%)	២១ (២.១៤%)
ការប្រើសា ធារណៈ ៣ប្រភេទ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២ (១០០%)	៤ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៥.០០%)	២ (៥.០០%)	៤ (៤.១៤%)

គំនិតសំគាល់

ចំនួនយុវវ័យរស់តាមផ្ទះម្នាក់ៗដែលប្រើសារធាតុញៀន បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ និងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀត ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ បច្ចុប្បន្ននេះ ៧៧.៥៥% នៃយុវវ័យរស់តាមផ្ទះតែង កំពុងប្រើសារធាតុញៀនជាង ៧៣.៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ ក្រុមកុមាររស់តាមផ្ទះតែង គឺជាក្រុមដែលងាយ រងគ្រោះបំផុតទៅនឹងការប្រើសារធាតុញៀន និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីធម្មជាតិនៃជីវិតតាមដងវិថីដែល មានទំនាក់ទំនង តិចតួចជាមួយអ្នកថែទាំ ឬ បច្ចុប្បន្ននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកថែទាំ។ តាមការបង្ហាញពីចំនួនសរុបនៃ យុវវ័យ រស់តាមផ្ទះ ការប្រើសារធាតុញៀន មានការកើនឡើងដ៏កំហុស ក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានអាយុច្រើនជាងគេ ទោះបីជាការកើនឡើងនេះបានកើតមាននៅគ្រប់ក្រុមអាយុក៏ដោយ។ ការប្រើសារធាតុញៀន ច្រើនប្រភេទរួមគ្នា បានកើនឡើងដ៏កំហុស នៅក្នុងក្រុមនេះ ដែលជាថ្មីម្តងទៀត ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពងាយរងគ្រោះ របស់ពួកគេ ទៅនឹងទម្លាប់នៃការប្រើសារធាតុញៀនដែលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងដោយហេតុថា នាពេលបច្ចុប្បន្ន នេះ មានយុវវ័យកាន់តែច្រើនឡើងមករស់នៅតាមផ្ទះ ដោយសារការប្រើសារធាតុញៀន ជាជាងបង្កើតទម្លាប់ប្រើ សារធាតុញៀន បន្ទាប់ពីមកនៅរស់តាមផ្ទះ។ អត្រាប្រើសារធាតុញៀនរបស់ក្មេងប្រុស កំពុងតែកើនឡើងឆាប់ រហ័សជាងក្មេងស្រី។

កំរិតនៃការប្រើសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមកុមាររស់តាមផ្ទះជាមួយគ្រួសារ (តាមការសិក្សាមុនៗក្រុម នេះ ពុំសូវប្រើសារធាតុញៀនទេ) បានកើនឡើងពីចំនួន ២៥.៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ៣៤.៣៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ប៉ុន្តែនៅតែជាក្រុមដែលទំនងជាពុំសូវប្រើសារធាតុញៀនដដែល។

ក្រុមហ៊ុន/យុទ្ធវិស័យសំណើតែម្នាក់ឯកតាមផ្ទាល់

ប្រភេទសារធាតុភ្លៀងដែលបានប្រើ និងវិធីប្រើប្រាស់

ប្រភេទសារ/ការប្រើសារ ធាតុភ្លៀង	ភេទ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការហិត	ក្មេងប្រុស	១ (៥០%)	៨ (៨៨.៨៨%)	៣១ (៩៣.៣៣%)	៤៩ (៩៤.២៣%)	៤៨ (៩៦%)	១៣៧ (៩៣.៨៣%)
	ក្មេងស្រី	១ (៥០%)	១ (១១.១១%)	២ (៦.០៦%)	៣ (៩.៣៧%)	២ (៤%)	៩ (៦.១៧%)
	សរុប	២ (១០០%)	៩ (៩៩.៩៩%)	៣៣ (៩៩.៣៩%)	៥២ (៩៣.៦០%)	៥០ (៩៣.៦៧%)	១៤៦ (៩៩.៩៩%)
ATS លេប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ចាក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
ATS ជក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	១ (១០០%)	២៩ (៩៦.៦៦%)	៨៨ (៨៩.៧៩%)	២០៤ (៨៨.៣១%)	៣៤២ (៨៩.៤៤%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣.៣៣%)	១០ (១០.២១%)	២៧ (១១.៦៩%)	៣៨ (៩.៥៦%)
	សរុប	០ (០%)	១ (១០០%)	៣០ (៩៩.៩៩%)	៩៨ (៩៩.៩៩%)	២៣១ (៩៩.៩៩%)	៣៨០ (៩៩.៩៩%)
ការប្រើ ATS សរុប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	១ (១០០%)	២៩ (៩៦.៦៦%)	៨៨ (៨៩.៧៩%)	២០៤ (៨៨.៣១%)	៣៤២ (៨៩.៤៤%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣.៣៣%)	១០ (១០.២១%)	២៧ (១១.៦៩%)	៣៨ (៩.៥៦%)
	សរុប	០ (០%)	១ (១០០%)	៣០ (៩៩.៩៩%)	៩៨ (៩៩.៩៩%)	២៣១ (៩៩.៩៩%)	៣៨០ (៩៩.៩៩%)
ហេរ៉ូអ៊ីនចាក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	៧ (១០០%)	៨៧ (៩៤.៥៦%)	៩៧ (៩៩.០៩%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (៥.៤៤%)	៥ (៥.០៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	៧ (១០០%)	៩២ (៩៩.៩៩%)	១០២ (៩៩.៩៩%)
ហេរ៉ូអ៊ីនជក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	១៥ (៨៣.៣៣%)	២៨ (៩០.៣២%)	៤៧ (៨៨.៦៧%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១៥.៦២%)	៣ (៩.៣៧%)	៦ (១១.៣៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	១៨ (៩០.៩១%)	៣១ (៩៩.៦៩%)	៥៣ (៩៩.៩៩%)
ហេរ៉ូអ៊ីនចាក់ និង ជក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៣ (១០០%)	៣១ (១០០%)	៣៥ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៣ (១០០%)	៣១ (១០០%)	៣៥ (១០០%)
ការប្រើហេរ៉ូអ៊ីន សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	៧ (១០០%)	២៦ (៨៨.៨៩%)	១១៥ (៩៣.៤៩%)	១៤៨ (៩៦.៩០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១៥.៦២%)	៨ (៣៣.៣៣%)	១១ (៥០.០០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	៧ (១០០%)	២៩ (៩៦.៥១%)	១២៣ (៩៦.៨២%)	១៥៩ (៩៦.៩០%)
កេតាមីនហិត	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (៧៩%)	៣ (៧៩%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២៥%)	១ (២៥%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	៤ (១០០%)
កេតាមីនលេប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
ការប្រើកេតាមីន សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៨០%)	៤ (៨០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២០%)	១ (២០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (១០០%)	៥ (១០០%)
កាណាប៊ីសសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (១០០%)	២៤ (៩៦.៣៣%)	២៩ (៩៦.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៨.៣៣%)	២ (៨.៣៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (១០០%)	២៦ (៩៤.៤៤%)	៣១ (៩៤.៤៤%)
គ្រឿងស្រវឹង សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៨ (១០០%)	៥១ (៩៩.០៧%)	៦០ (៩៩.០៧%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០	៥ (៨.៣៣%)	៥ (៨.៣៣%)

	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១៥៣%)	៨ (១២៣%)	២៦ (៨៦១៣%)	៦៥ (១៣៦៣%)
ថ្នាំរម្ងាប់ អាមូណីសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (១០០%)	១២ (៨០%)	១៦ (៨៤.២១%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (២០%)	៣ (១៥.៧៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (២១.០៥%)	១៥ (៧៨.៩៥%)	១៩ (៧៨.៧៧%)
ការប្រើសារធាតុ ក្លៀនទីនសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២ (៦៦.៦៦%)	២៣ (៩២%)	២៧ (៩០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣៣.៣៤%)	២ (៨%)	៣ (១០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	២ (៦៦.៦៦%)	៣ (១០០%)	២៥ (៨៣.៣៣%)	៣០ (៦៦.៦៦%)
ផ្សេងៗ	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	២ (៦៦.៦៦%)	៣ (៧៥%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣៣.៣៤%)	១ (២៥%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥០%)	៣ (៧៥%)	៤ (៥៥.៥៦%)
ការលក់ឈាម	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៦ (១០០%)	៤៨ (៩៧.៩៥%)	៥៤ (៩៨.១%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២.០៥%)	១ (១.៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៦ (១០០%)	៤៩ (៨៩.៩៥%)	៥៥ (៩៩.៨%)

កុមារ/យុវវ័យរស់នៅតាមផ្ទះជាមួយគ្រួសារ

ប្រភេទសារធាតុញៀនដែលបានប្រើ និងវិធីប្រើប្រាស់

ប្រភេទរោគ/ ការប្រើសារធាតុញៀន	ភេទ	០-៨ ឆ្នាំ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការហឹក	ក្មេងប្រុស	៥ (១០០%)	១០ (១០០%)	២០ (១០០%)	១០ (១០០%)	៣ (៧៥%)	៤៨ (៩៧.៥៥%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២៥%)	១ (២.០៥%)
	សរុប	៥ (១០.០%)	១០ (២០.០%)	២០ (៤០.០%)	១០ (២០.០%)	៤ (៨.០%)	៤៨ (៩០.៤០%)
ATS លេប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ចាក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ជក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១២ (៩២.៣%)	១៧ (១០០%)	១៣ (៧៦.៤៧%)	៤២ (៨៩.៣៦%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (៧.៧%)	០ (០%)	៤ (២៥.៥៣%)	៥ (១០.៦៤%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១៣ (៩០.០%)	១៧ (១០០.០%)	១៧ (៩០.០%)	៤៧ (៩០.០%)
ការប្រើ ATS សរុប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១២ (៩២.៣%)	១៧ (១០០%)	១៣ (៧៦.៤៧%)	៤២ (៨៩.៣៦%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	១ (៧.៧%)	០ (០%)	៤ (២៥.៥៣%)	៥ (១០.៦៤%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១៣ (៩០.០%)	១៧ (១០០.០%)	១៧ (៩០.០%)	៤៧ (៩០.០%)
ហ្វេរ៉ូអ៊ីនចាក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
ហ្វេរ៉ូអ៊ីនជក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ហ្វេរ៉ូអ៊ីនចាក់ និងជក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ការប្រើហ្វេរ៉ូអ៊ីន សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
កេតាមីនហឹក	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
កេតាមីនលេប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ការប្រើកេតាមីន សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
កាណាប៊ីសសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១០០%)
គ្រឿងស្រវឹង សរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៤ (១០០%)	៦ (១០០%)	១១ (១០០%)

	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥.១%)	៤ (៣៦.៣៦%)	៦ (៥៤.៥៤%)	១១ (១១.៣៤%)
ថ្នាំរម្ងាប់ អាមូណីសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១០៣%)
ការប្រើសារធាតុ ច្រៀងចំរុះសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ផ្សេងៗ	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ការលក់ឈាម	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥០%)	១ (៥០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៥០%)	១ (៥០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២ (២.០៦%)

កំណត់សំគាល់

ការប្រើការប្រើប្រាស់

ការប្រើការប្រើប្រាស់ បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងចំណោមកុមាររស់តាមផ្ទះ និងកុមាររស់នៅតាមផ្ទះ ជាមួយគ្រួសារ។ ការប្រើការប្រើប្រាស់ មានកំរិតទាបជាងការប្រើថ្នាំអំប្បឈាមដែលជាសារធាតុញៀនដែលគេ និយមប្រើបំផុត ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់នេះនៅតែជាសារធាតុញៀនដែលនិយមប្រើបំផុត ក្នុងចំណោមកុមាររស់នៅតាមផ្ទះ ជាមួយគ្រួសារ។ ការប្រើការប្រើប្រាស់ បានថយចុះនៅគ្រប់ក្រុមអាយុ និងភេទទាំងពីរ នៅទូទាំងក្រុមទាំងពីរ។

អំប្បឈាម

ការប្រើថ្នាំអំប្បឈាម បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ នៅក្នុងក្រុមកុមារ រស់តាមផ្ទះតែម្នាក់ឯង ការប្រើថ្នាំនេះបានកើនឡើងពី ៩.៥% ទៅ ៧៣.៦% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកប្រើសារធាតុ ញៀនទាំងអស់ ចំណែកនៅក្នុងក្រុមកុមាររស់នៅតាមផ្ទះជាមួយគ្រួសារ ការប្រើថ្នាំអំប្បឈាម បានកើនឡើង ពី ២៣.៤% ទៅ ៤៨.៤% ក្នុងចំណោមក្រុមប្រើសារធាតុទាំងអស់។ ការណ៍នេះបញ្ជាក់អះអាងពីការប្រើ និងភាព អាចរកទិញបាននៃថ្នាំអំប្បឈាម ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រុមកុមាររស់តាមផ្ទះសរុប។

ហេរ៉ូអ៊ីន

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីនក្នុងចំនួនក្មេងតាមផ្ទះតែម្នាក់ឯង មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លា (ត្រឹម ១៩.៤%) អំឡុងឆ្នាំ ២០០៤ បើទោះបីជា វាត្រូវបានសង្កេត ជាលើកដំបូង តែ (១.០៣%) ក្នុងចំណោម កុមារនៃ គ្រួសារដែលរស់នៅតាមផ្ទះក៏ដោយ។

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងក្រុមអាយុចាស់ជាងនេះ និង ជាចំបង នៅក្នុង ចំណោមមនុស្សប្រុស។ ការចាក់ថ្នាំ នៅតែជាវិធីដ៏ទូទៅបំផុត នៃការប្រើ ចំណោមយុវវ័យ ដែលរស់នៅតាមផ្ទះតែ ម្នាក់ឯង ទន្ទឹមនឹងនេះ ចំពោះកុមារ នៃក្រុមគ្រួសារតាមផ្ទះ ការចាក់ថ្នាំ (ក្រោយបន្ទាប់ពី ការចង្អុលដំបូង នៃការ ប្រើប្រាស់ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន) ត្រូវបានគេសង្កេត ជាលើកដំបូង។

កេតាមីន

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកេតាមីន បានថយចុះ សំរាប់ចំនួនមនុស្ស ដែលរស់នៅតាមផ្ទះតែម្នាក់ឯង និង គ្មាន ហេតុការណ៍ នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកេតាមីន ត្រូវបានរកឃើញ ចំពោះ កុមារ នៃក្រុមគ្រួសារតាមផ្ទះនោះទេ (ដូច នៅឆ្នាំ ២០០៤) ។

កាណាប៊ីស

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំកាណាប៊ីស បានថយចុះយ៉ាងច្រើន ចំពោះក្រុមទាំងពីរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ឆ្នាំ ២០០៤ និង បានឆ្លុះបញ្ចាំង ពីនិន្នាការសំរាប់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់ ។

គ្រឿងស្រវឹង

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង មានពាក់កណ្តាល នៅក្នុងក្រុមទាំងនេះ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការទូទៅរបស់ ក្រុមគោលដៅ។ នេះគួរឱ្យគិតសំគាល់ជាពិសេស ចំពោះកុមារនៃក្រុមគ្រួសារតាមថ្នល់ ដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿង ស្រវឹង ធ្លាប់ជាកត្តាចម្បង នៅប៉ុន្មានឆ្នាំមុនៗ។ នេះអាចចាត់ទុកថាជាការផ្លាស់ប្តូរខាងទំលាប់របស់អ្នកផ្តល់ការ ថែទាំនៅតាមផ្លូវ ដោយផ្លាស់ប្តូរពីគ្រឿងស្រវឹង ទៅសារធាតុញៀនដែលអាចប្រើបានដទៃទៀត ។

ថ្នាំតាមឱសថស្ថាន

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមឱសថស្ថាន បានថយចុះ សំរាប់ក្រុមទាំងពីរ ដែលការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការនៃចំនួន អ្នកដែលប្រើសារធាតុញៀនសរុប ។

ការប្រើសារធាតុញៀនចំរុះ

ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនចំរុះ បានកើនឡើងពីរដង ចំពោះចំនួនកុមារតាមថ្នល់តែង បើទោះបី ជាវាជាការប្រើមានកំរិតច្រើន ក៏ដោយ។ ការពិតដែលថានៅមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ចំរុះ សំរាប់កុមារនៃក្រុម គ្រួសារតាមថ្នល់នោះ បង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ចំរុះ ទំនងជាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហេរូអ៊ីន ។

ការលក់ឈាម

ការលក់ឈាម នៅតែបន្តមានច្រើនបំផុត នៅក្នុងចំណោមយុវវ័យតាមថ្នល់តែម្នាក់ឯង និងបង្ហាញពី ស្ថានភាពជីវភាពមិនទៀងទាត់ នៅតាមថ្នល់ និង តំរូវការកើនឡើង ចំពោះការរកប្រាក់ចំណូល។ ការលក់ឈាម នេះ ចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន នៅក្នុងក្រុមនេះ ។

កុមាររស់នៅសហគមន៍/កុមារធ្វើការនៅតាមផ្លូវ

	ភេទ	៨ ឆ្នាំចុះ	៩-១១ ឆ្នាំ	១២-១៥ ឆ្នាំ	១៦-១៨ ឆ្នាំ	១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ច្រើនមុខ (សរុប)	ក្មេងប្រុស	៨ (១០០%)	៤១ (៩៥.៣៤%)	៧២ (៩៣.៥%)	១០៣ (៨៣.៧៣%)	១៩៩ (៩២.៩៩%)	៤២៤ (៩០.៩៨%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	២ (៤.៦៦%)	៥ (៦.៥%)	២០ (១៦.២៧%)	១៥ (៧.០១%)	៤២ (៩.០២%)
	សរុប	៨ (១០០%)	៤៣ (៩០.០%)	៧៧ (១០០.០%)	១២៣ (១០០.០%)	២១៤ (១០០.០%)	៤៦៦ (១០០.០%)
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ១ មុខ	ក្មេងប្រុស	៨ (១០០%)	៤១៩៥.៣៤%	៦០ (៩២.៣%)	៦២ (៧៨.៤៨%)	១១៣ (៩០.៤%)	២២៨ (៨៨.៧៥%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	២ (៤.៦៦%)	៥ (៧.៧%)	១៧ (២១.៥២%)	១២ (៩.៦%)	៣៦ (១១.២៥%)
	សរុប	៨ (១០០%)	៤៣ (១០០.០%)	៦៥ (១០០.០%)	៧៩ (១០០.០%)	១២៥ (១០០.០%)	២៦៤ (១០០.០%)
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ២ មុខ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១១ (១០០%)	៣៣ (៩៧.០៥%)	៥១ (៩៤.៤៤%)	៩៥ (៩៥.៩៥%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (២.៩៤%)	៣ (៥.៨៨%)	៤ (៤.០៥%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១១ (១០០.០%)	៣៤ (១០០.០%)	៥៤ (១០០.០%)	៩៩ (១០០.០%)
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ៣ មុខ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៦ (១០០%)	២៧ (១០០%)	៣៤ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០.០%)	៦ (១០០.០%)	២៧ (១០០.០%)	៣៤ (១០០.០%)
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ៤ មុខ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៦៦.៦៦%)	៧ (១០០%)	៩ (៩០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣៣.៣៣%)	០ (០%)	១ (១០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	៧ (១០០%)	១០ (១០០%)
ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ៥ មុខ	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១០០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	២ (១០០%)	៣ (១០០%)

កំណត់សំគាល់

ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងចំណោមប្រជាជនតាមថ្នាក់ បានកើនឡើង ១៦.៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ហើយ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនពាក់កណ្តាលនៃក្រុមធ្វើការតាមថ្នាក់ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន។ តួលេខនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំង ឱ្យឃើញពីនិន្នាការទូទៅនៃការកើនឡើងក្នុងការ ប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងចំណោមកុមារ និង យុវវ័យតាមថ្នាក់។

ការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនច្រើនប្រភេទបានថយចុះបន្តិចបន្តួចក្នុងក្រុមនេះ និងបង្ហាញឱ្យឃើញពីការ ប្រមូលផ្តុំប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ដូចជាអំប៊ូតាមីន និងក្នុងកំរិតស្រាលជាងនេះ គឺហេរ៉ូអ៊ីន។ ជាការគួរឱ្យចាប់ អារម្មណ៍ ទោះបីជាការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនច្រើនមុខបានថយចុះក៏ដោយ ក៏ចំនួននៃសារធាតុញៀនដែល កំពុងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនតូច បានកើនឡើង ។

កុមារ/យុវវ័យដែលរស់នៅជាយន្តការ/តាមផ្ទះ

ប្រភេទសារធាតុ ញៀន/ការប្រើ ប្រាស់	ភេទ	អាយុ ៨ ឆ្នាំចុះ	អាយុ ៩-១១ ឆ្នាំ	អាយុ ១២-១៥ ឆ្នាំ	អាយុ ១៦-១៨ ឆ្នាំ	អាយុ ១៩-២៣ ឆ្នាំ	សរុប
ការហឹក	ក្មេងប្រុស	៤ (១០០%)	២៨ (៩៣.៣៣%)	៥៨ (៩៥.០៨%)	៣៨ (៩៥%)	២១ (៩៥.៤៥%)	១៤៩ (៩៤.៩%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	២ (៦.៦៧%)	៣ (៩.៥២%)	២ (៥%)	១ (៤.៥៥%)	៨ (៥.១%)
	សរុប	៤ (២.៥៤%)	៣០ (១៩.១%)	៦១ (៣៨.៣៥%)	៤០ (២៥.៤៧%)	២២ (១៤.០៤%)	១៥៧ (៣៣.៦៩%)
ATS លេប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ចាក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ATS ដក់ (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	២ (១០០%)	២ (១០០%)	២១ (៩១.៣%)	៦៤ (៩០.១៤%)	១២៩ (៩០.៨៤%)	២១៨ (៩០.៨៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	២ (៨.៧%)	៧ (៩.៨៦%)	១៣ (៩.១៦%)	២២ (៩.១៧%)
	សរុប	២ (០.៨៣%)	២ (០.៨៣%)	២៣ (៩.៥៨%)	៧១ (២៩.៥៨%)	១៤២ (៥៩.១៨%)	២៤០ (១០០%)
ការប្រើប្រាស់ ATS សរុប (យ៉ាម៉ា)	ក្មេងប្រុស	២ (១០០%)	២ (១០០%)	២១ (៩១.៣%)	៦៤ (៩០.១៤%)	១២៩ (៩០.៨៤%)	២១៨ (៩០.៨៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	២ (៨.៧%)	៧ (៩.៨៦%)	១៣ (៩.១៦%)	២២ (៩.១៧%)
	សរុប	២ (០.៨៣%)	២ (០.៨៣%)	២៣ (៩.៥៨%)	៧១ (២៩.៥៨%)	១៤២ (៥៩.១៨%)	២៤០ (១០០%)
ហ្វឹកម៉ូនចាក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១១ (១០០%)	៣០ (៩៦.៧៧%)	៤១ (៩៦.៧៧%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣.២៣%)	១ (២.២៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១១ (២៦.១៥%)	៣១ (៧៣.២១%)	៤២ (៦៧.៧៤%)
ហ្វឹកម៉ូនដក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៤ (៩៧.១៤%)	១៤ (១០០%)	១៨ (៨៩.៧១%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (៤៦.៨៦%)	០ (០%)	៣ (១៤.២៩%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៧ (៣៣.៣៣%)	១៤ (៦៦.៦៧%)	២១ (៣៣.៦៦%)
ហ្វឹកម៉ូនដក់ និងចាក់	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
ការប្រើប្រាស់ ហ្វឹកម៉ូនសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១៥ (៨៦.៣៥%)	៤៤ (៩៧.៧៧%)	៥៩ (៩៣.៥៤%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១៧.៦៥%)	១ (២.២៣%)	៤ (៦.៤៦%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១៨ (១០០%)	៤៥ (៩៧.៧៧%)	៦៣ (១០០%)
កេតាមីនហឹក	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	៦ (១០០%)	៧ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១៤.២៨%)	៦ (៨៥.៧២%)	៧ (៨៧.៥%)
កេតាមីនលេប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	០ (០%)	១ (១០០%)
ការប្រើប្រាស់ កេតាមីនសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	៦ (១០០%)	៨ (១០០%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	៦ (១០០%)	៨ (១០០%)
កញ្ចាស្នូតសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៧ (៨៧.៥%)	១៦ (៩៤.១១%)	២៣ (៩៥.៦%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (១២.៥%)	១ (៥.៨៩%)	២ (៨.៤%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៨ (១០០%)	១៧ (១០០%)	២៥ (១០០%)
គ្រឿងស្រវឹងសរុប	ក្មេងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	៧ (៧៧.៧៧%)	៤០ (៩៧.៥៦%)	៤៩ (៩៩.៣៣%)
	ក្មេងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (២២.២២%)	១ (១.១១%)	៣ (៣.៣៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	៩ (១០០%)	៤១ (១០០%)	៥២ (១០០%)

ថ្នាំប្រឆាំងការរមួល សរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	១ (១០០%)	១ (១៦.៦៦)	២ (៤០%)	៤ (៩៣.៣៣%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៥ (៨៣.៣៤%)	៣ (៦០%)	៨ (៦៦.៦៧%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	១ (៨.៣៣%)	៦ (៥០%)	៥ (៤១.៦៧%)	១២ (២៥.៥៧%)
ថ្នាំប្រឆាំងចំណុះសរុប	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៦៦.៦៦%)	១១ (១០០%)	១៣ (៩៣.៣៣%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣៣.៣៤%)	០ (០%)	១ (៣.៣៣%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	១១ (១០០%)	១៤ (១០០%)
ផ្សេងៗទៀត	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (១០០%)	២ (១០០%)	៤ (១០០%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៥០%)	២ (៥០%)	៤ (៥០%)
ការលក់ឈាម	ក្នុងប្រុស	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	២ (៦៦.៦៦%)	១៤ (១០០%)	១៦ (៩៤.១១%)
	ក្នុងស្រី	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	១ (៣៣.៣៤%)	០ (០%)	១ (៥.៨៨%)
	សរុប	០ (០%)	០ (០%)	០ (០%)	៣ (១០០%)	១៤ (១០០%)	១៧ (១០០%)

កំណត់សំគាល់

ការហិត

ការប្រើប្រាស់ការហិតបានថយចុះ ៦,២% នៅឆ្នាំ ២០០៤ ហើយតំណាងអោយ ៣៣,៦៩% នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនក្នុងក្រុមនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ តួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីនិន្នាការថយចុះទូទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ ដោយសារតែអំហូតាមីន និងហេរ៉ូអ៊ីនចាប់ផ្តើមមានវត្តមានជាប្រចាំក្នុងក្រុមនេះ ។

ថ្វីបើការប្រើប្រាស់ការហិតមានការថយចុះក៏ដោយ កំរិតនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមនារីបានកើនឡើងបន្តិចក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ។

អំហូតាមីន

ការប្រើប្រាស់អំហូតាមីនក្នុងក្រុមនេះបានកើនឡើងបន្តិចក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ ប៉ុន្តែវានៅតែជាសារធាតុញៀនដែលគេប្រើប្រាស់ទូទៅបំផុត (៥១,៥%) ។ ការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់អំហូតាមីន ទំនងជាទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីន ។ ថ្នាំអំហូតាមីនចាក់ដែលនៅតែប្រើក្នុងឆ្នាំ២០០៤ មិនត្រូវបានប្រើទេនៅក្នុងការអង្កេតឆ្នាំ២០០៥ ។

ហេរ៉ូអ៊ីន

ការប្រើប្រាស់ហេរ៉ូអ៊ីន បានកើនឡើងពី ៥.១% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ១៣.៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ហើយកំពុងតែកើតមានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមនេះ ។ ហេរ៉ូអ៊ីនចាក់ ដែលជាវិធីប្រើប្រាស់ដែលនិយមប្រើបំផុតនោះ បានកើនឡើងពី ១៤.៨៤% ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ដល់ ៦៧.៧៤% ។

កេតាមីន

ដូចក្នុងក្រុមដទៃទៀតដែរ ការប្រើប្រាស់កេតាមីន បានថយចុះក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ។

កញ្ចក់កាណាប៊ីស

ការប្រើកញ្ចក់កាណាប៊ីស បានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ស្របជាមួយចំនួនអ្នកប្រើសារធាតុញៀនសរុប ។

គ្រឿងស្រវឹង

ការប្រើគ្រឿងស្រវឹង បានថយចុះយ៉ាងគួរឱ្យកត់សំគាល់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និងឆ្នាំមុនៗ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការទូទៅ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ។

ថ្នាំតាមឱសថស្ថាន

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមឱសថស្ថាន បានថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៤ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការទូទៅនៃការប្រើសារធាតុញៀនចំរុះ ។